



الرياضيات

الصف الثاني عشر - المسار الأكاديمي

الفصل الدراسي الثاني

12

إجابات التمارين

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية:

☎ 06-5376262 / 237 📠 06-5376266 ✉ P.O.Box: 2088 Amman 11941

📌 @nccdjor @ feedback@nccd.gov.jo 🌐 www.nccd.gov.jo



إجابات كتاب التمارين- مادة الرياضيات- الصف الثاني عشر الأكاديمي ف2 (طبعة 2025)

الوحدة الخامسة: التكامل

أستعد لدراسة الوحدة

إيجاد تكاملات غير محدودة لاقترانات القوة صفحة 6	
1	$\int 3x^2 dx = x^3 + C$
2	$\int (2 + x^3 + 5x^{-2}) dx = 2x + \frac{1}{4}x^4 - 5x^{-1} + C = 2x + \frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{x} + C$
3	$\int (2x^7 - 4x^{-4}) dx = \frac{1}{4}x^8 + \frac{4}{3}x^{-3} + C = \frac{1}{4}x^8 + \frac{4}{3x^3} + C$
4	$\int (x^{\frac{1}{2}} - 3x^{-\frac{1}{2}}) dx = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3}\sqrt{x^3} - 6\sqrt{x} + C$
5	$\int (4x^4 - 4x^2 + x) dx = \frac{4}{5}x^5 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C$
6	$\int (x^2 + 7 - 2x) dx = \frac{1}{3}x^3 + 7x - x^2 + C$
7	$\int (x^2 + 2x - 3) dx = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + C$
8	$\int (2x + 5)^5 dx = \frac{1}{12}(2x + 5)^6 + C$
9	$\int \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} dx = \int (x-1) dx = \frac{1}{2}x^2 - x + C$
إيجاد تكاملات محدودة لاقترانات القوة صفحة 7	
10	$\int_{-2}^3 x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 \Big _{-2}^3 = \frac{1}{6}(729 - 64) = \frac{665}{6}$
11	$\int_1^2 (2x^{-3} + 3x) dx = \left(-x^{-2} + \frac{3}{2}x^2\right) \Big _1^2 = \left(-\frac{1}{4} + 6\right) - \left(-1 + \frac{3}{2}\right) = \frac{21}{4}$
12	$\int_1^4 \frac{2 + \sqrt{x}}{x^2} dx = \int_1^4 \left(2x^{-2} + x^{-\frac{3}{2}}\right) dx = \left(-2x^{-1} - 2x^{-\frac{1}{2}}\right) \Big _1^4$ $= \left(-\frac{1}{2} - 1\right) - (-2 - 2) = \frac{5}{2}$



إيجاد قاعدة اقتتران عُلِّمت مشتقته ونقطة تحققه (الشرط الأولي) صفحة 7

$$13 \quad f(x) = \int (x^2 + 1) dx = \frac{1}{3}x^3 + x + C$$

$$f(0) = 0 + 0 + C$$

$$8 = 0 + C \Rightarrow C = 8$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x + 8$$

إيجاد المساحة المحصورة بين منحنى اقتتران والمحور x صفحة 8

$$14 \quad 2x^2 - x^3 = 0 \Rightarrow x^2(2 - x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$$

$$f(1) = 2 - 1 = 1 \Rightarrow f(x) > 0, \quad 0 < x < 2$$

$$Area = \int_0^2 f(x) dx = \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^2$$

$$= \left(\frac{16}{3} - 4 \right) - 0 = \frac{4}{3}$$

$$15 \quad x^2 - 8x + 12 = 0 \Rightarrow (x - 6)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 6, x = 2$$

$$f(3) = 9 - 24 + 12 = -3 \Rightarrow f(x) < 0, \quad 2 < x < 6$$

$$Area = - \int_2^6 f(x) dx = \int_2^6 (-x^2 + 8x - 12) dx = \left(-\frac{1}{3}x^3 + 4x^2 - 12x \right) \Big|_2^6$$

$$= (-72 + 144 - 72) - \left(-\frac{8}{3} + 16 - 24 \right) = \frac{32}{3}$$

$$16 \quad x^3 + 4x^2 - 11x - 30 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 2)(x + 5) = 0$$

$$\Rightarrow x = 3, x = -2, x = -5$$

$$f(-3) = -27 + 36 + 33 - 30 = 12 \Rightarrow f(x) > 0, \quad -5 < x < -2$$

$$f(0) = -30 \Rightarrow f(x) < 0, \quad -2 < x < 3$$

$$Area = \int_{-5}^{-2} f(x) dx + \left(- \int_{-2}^3 f(x) dx \right)$$

$$= \int_{-5}^{-2} (x^3 + 4x^2 - 11x - 30) dx + \int_{-2}^3 (-x^3 - 4x^2 + 11x + 30) dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{11}{2}x^2 - 30x \right) \Big|_{-5}^{-2} + \left(-\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{11}{2}x^2 + 30x \right) \Big|_{-2}^3$$

$$= \frac{863}{6}$$



إيجاد حجم المُجسَّم الناتج من دوران منحنى اقتران حول المحور x صفحة 11

$$V = \pi \int_1^8 (f(x))^2 dx = \pi \int_1^8 x^{\frac{2}{3}} dx$$

$$= \frac{3\pi}{5} x^{\frac{5}{3}} \Big|_1^8 = \frac{3\pi}{5} ((8)^{\frac{5}{3}} - (1)^{\frac{5}{3}}) = \frac{93\pi}{5} = 18.6\pi$$

إذن، حجم المجسم يساوي 18.6π وحدة مكعبة.

الدرس الأول: تكامل اقترانات خاصة

$$1 \quad \int 4e^{-5x} dx = -\frac{4}{5}e^{-5x} + C$$

$$2 \quad \int (\sin 2x - \cos 2x) dx = -\frac{1}{2}\cos 2x - \frac{1}{2}\sin 2x + C$$

$$3 \quad \int \cos^2 2x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$$

$$4 \quad \int \frac{e^x + 4}{e^{2x}} dx = \int (e^{-x} + 4e^{-2x}) dx = -e^{-x} - 2e^{-2x} + C$$

$$5 \quad \int (\cot x \csc x - 2e^x) dx = -\csc x - 2e^x + C$$

$$6 \quad \int (3 \cos 3x - \tan^2 x) dx = \int (3 \cos 3x - (\sec^2 x - 1)) dx$$

$$= \sin 3x - \tan x + x + C$$

$$7 \quad \int \cos x (1 + \csc^2 x) dx = \int \cos x \left(1 + \frac{1}{\sin^2 x}\right) dx$$

$$= \int \cos x + \cot x \csc x dx = \sin x - \csc x + C$$

$$8 \quad \int \frac{x^2 + x - 4}{x + 2} dx = \int \left(x - 1 - \frac{2}{x + 2}\right) dx = \frac{1}{2}x^2 - x - 2 \ln|x + 2| + C$$

$$9 \quad \int \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx = \int e^{-\frac{1}{2}x} dx = -2e^{-\frac{1}{2}x} + C$$

$$10 \quad \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{x^2}\right) dx = \int (\sec^2 x + x^{-2}) dx = \tan x - \frac{1}{x} + C$$



11	$\int \frac{x^2 - 2x}{x^3 - 3x^2} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2 - 6x}{x^3 - 3x^2} dx = \frac{1}{3} \ln x^3 - 3x^2 + C$
12	$\int \ln e^{\cos x} dx = \int \cos x dx = \sin x + C$
13	$\int \sin^2 \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \int (1 - \cos x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin x) + C$
14	$\int \frac{3}{2x-1} dx = \frac{3}{2} \int \frac{2}{2x-1} dx = \frac{3}{2} \ln 2x-1 + C$
15	$\int \frac{3 - 2 \cos \frac{1}{2}x}{\sin^2 \frac{1}{2}x} dx = \int \left(3 \csc^2 \frac{1}{2}x - 2 \cot \frac{1}{2}x \csc \frac{1}{2}x \right) dx$ $= -6 \cot \frac{1}{2}x + 4 \csc \frac{1}{2}x + C$
16	$\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + 4} dx = \ln e^x + 4 \Big _0^1 = \ln(e + 4) - \ln 5 = \ln \frac{e + 4}{5}$
17	$\int_1^2 \frac{1}{3x-2} dx = \frac{1}{3} \int_1^2 \frac{3}{3x-2} dx = \frac{1}{3} \ln 3x-2 \Big _1^2 = \frac{1}{3} \ln 4 - 0 = \frac{1}{3} \ln 4$
18	$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin 2x dx = -\frac{1}{4} \cos 2x \Big _0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$
19	$\int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x + 3 \sin x)^2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos^2 x + 6 \sin x \cos x + 9 \sin^2 x) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 - \sin^2 x + 6 \sin x \cos x + 9 \sin^2 x) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 8 \sin^2 x + 3 \sin 2x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (1 + 4(1 - \cos 2x) + 3 \sin 2x) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (5 - 4 \cos 2x + 3 \sin 2x) dx = \left(5x - 2 \sin 2x - \frac{3}{2} \cos 2x \right) \Big _0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{5\pi - 2}{4}$
20	$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx = - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sin^2 x}{\cos x} dx = - \ln \cos x \Big _0^{\frac{\pi}{4}} = - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 = \frac{1}{2} \ln 2$




21	$\int_0^{\frac{\pi}{16}} (\cos^2 2x - 4 \sin^2 x \cos^2 x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{16}} (\cos^2 2x - (2 \sin x \cos x)^2) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{16}} (\cos^2 2x - \sin^2 2x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{16}} \cos 4x dx = \frac{1}{4} \sin 4x \Big _0^{\frac{\pi}{16}} = \frac{1}{4\sqrt{2}}$
22	$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(1 + \sin x)^2}{\cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + 2 \sin x + \sin^2 x}{\cos^2 x} dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{2 \sin x}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \right) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x + 2 \tan x \sec x + \tan^2 x) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x + 2 \tan x \sec x + \sec^2 x - 1) dx$ $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \sec^2 x + 2 \tan x \sec x - 1) dx$ $= (2 \tan x + 2 \sec x - x) \Big _0^{\frac{\pi}{4}} = 2 + 2\sqrt{2} - \frac{\pi}{4} - 2 = 2\sqrt{2} - \frac{\pi}{4}$
23	$\int_0^1 \frac{6x}{3x+2} dx = \int_0^1 \left(2 - \frac{4}{3x+2} \right) dx = \left(2x - \frac{4}{3} \ln 3x+2 \right) \Big _0^1$ $= 2 - \frac{4}{3} \ln 5 + \frac{4}{3} \ln 2 = 2 + \frac{4}{3} \ln \frac{2}{5}$



National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development
24	$\int_1^k \frac{4}{2x-1} dx = 1$ $\Rightarrow 2 \ln 2x-1 \Big _1^k = 1$ $\Rightarrow 2 \ln 2k-1 = 1$ $\Rightarrow 2 \ln(2k-1) = 1$ $\Rightarrow \ln(2k-1) = \frac{1}{2}, k > \frac{1}{2} \text{ لأن}$ $\Rightarrow 2k-1 = e^{\frac{1}{2}}$ $\Rightarrow k = \frac{e^{\frac{1}{2}} + 1}{2}$	المركز الوطني لتطوير المناهج National Center for Curriculum Development	المركز الوطني لتطوير المناهج National Center for Curriculum Development
25	$\int_0^{\ln a} (e^x + e^{-x}) dx = \frac{48}{7}$ $\Rightarrow (e^x - e^{-x}) \Big _0^{\ln a} = \frac{48}{7}$ $\Rightarrow \left(a - \frac{1}{a}\right) - (1 - 1) = \frac{48}{7}$ $\Rightarrow a - \frac{1}{a} - \frac{48}{7} = 0$ $\Rightarrow 7a^2 - 48a - 7 = 0$ $\Rightarrow (7a+1)(a-7) = 0$ $\Rightarrow a = -\frac{1}{7} \text{ (تُرفض) , } a = 7$	المركز الوطني لتطوير المناهج National Center for Curriculum Development	المركز الوطني لتطوير المناهج National Center for Curriculum Development
26	$A = \int_0^{\pi} 2\cos^2 \frac{1}{2}x dx = \int_0^{\pi} (1 + \cos x) dx = (x + \sin x) \Big _0^{\pi} = \pi$	المركز الوطني لتطوير المناهج National Center for Curriculum Development	المركز الوطني لتطوير المناهج National Center for Curriculum Development
National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development



27	$f(x) = \int (e^{-x} + x^2) dx = -e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 + C$ $f(x) = -e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 + C$ $f(0) = -1 + C$ $4 = -1 + C \Rightarrow C = 5$ $\Rightarrow f(x) = -e^{-x} + \frac{1}{3}x^3 + 5$
28	$f(x) = \int \left(\frac{3}{x} - 4\right) dx = 3 \ln x - 4x + C$ $f(x) = 3 \ln x - 4x + C$ $f(1) = -4 + C$ $0 = -4 + C \Rightarrow C = 4$ $\Rightarrow f(x) = 3 \ln x - 4x + 4$
29	$s(3) - s(0) = \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 \frac{-t}{1+t^2} dt = -\frac{1}{2} \ln(1+t^2) \Big _0^3 = -\frac{1}{2} \ln 10 \text{ m}$
30	$d = \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 \frac{t}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} \ln(1+t^2) \Big _0^3 = \frac{1}{2} \ln 10 \text{ m}$
31	$s\left(\frac{\pi}{2}\right) - s(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} v(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6 \sin 3t dt = -2 \cos 3t \Big _0^{\frac{\pi}{2}} = 2 \text{ m}$
32	$6 \sin 3t = 0 \Rightarrow 3t = 0, \pi \Rightarrow t = 0, \frac{\pi}{3}$  $d = \int_0^{\frac{\pi}{2}} v(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6 \sin 3t dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} 6 \sin 3t dt + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} -6 \sin 3t dt$ $= -2 \cos 3t \Big _0^{\frac{\pi}{3}} + 2 \cos 3t \Big _{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = 2 + 2 + 0 - 2(-1) = 6 \text{ m}$



عندما $0 \leq t \leq 6$

$$s(t) = \int (8t - t^2) dt = 4t^2 - \frac{1}{3}t^3 + C_1$$

$$s(0) = 0 - 0 + C_1$$

$$0 = 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\Rightarrow s(t) = 4t^2 - \frac{1}{3}t^3, 0 \leq t \leq 6$$

عندما $t > 6$

$$s(t) = \int \left(15 - \frac{1}{2}t\right) dt = 15t - \frac{1}{4}t^2 + C_2$$

الموقع الابتدائي للجسيم في هذه الفترة هو موقعه في نهاية الفترة الأولى أي $s(6)$

$$\text{نحسب } s(6) \text{ من قاعدة الموقع السابقة } 72 - \frac{216}{3} = 144$$

$$s(6) = 90 - 9 + C_2$$

$$72 = 81 + C_2 \Rightarrow C_2 = -9$$

$$\Rightarrow s(t) = 15t - \frac{1}{4}t^2 - 9, t > 6$$

33

$$\Rightarrow s(40) = 15(40) - \frac{1}{4}(1600) - 9 = 191 \text{ m}$$

يُعرض فيما يلي حل لهذا السؤال بطريقة أخرى.

حل آخر:

$$s(40) - s(0) = \int_0^{40} v(t) dt$$

$$\Rightarrow s(40) = s(0) + \int_0^{40} v(t) dt$$

$$= 0 + \int_0^6 (8t - t^2) dt + \int_6^{40} \left(15 - \frac{1}{2}t\right) dt$$

$$= \left(4t^2 - \frac{t^3}{3}\right) \Big|_0^6 + \left(15t - \frac{t^2}{4}\right) \Big|_6^{40}$$

$$= \left(4(6^2) - \frac{6^3}{3}\right) - 0 + 15(40) - \frac{40^2}{4} - 15(6) + \frac{6^2}{4}$$

$$= 144 - 72 + 600 - 400 - 90 + 9 = 191 \text{ m}$$



1	$u = x^2 + 4 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$ $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx = \int \frac{x}{\sqrt{u}} \frac{du}{2x} = \int \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} du = u^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{x^2 + 4} + C$
2	$u = 1 - \cos \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \Rightarrow dx = \frac{2}{\sin \frac{x}{2}} du$ $\int \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right)^2 \sin \frac{x}{2} dx = \int u^2 \sin \frac{x}{2} \frac{2}{\sin \frac{x}{2}} du = \int 2u^2 du = \frac{2}{3} u^3 + C$ $= \frac{2}{3} \left(1 - \cos \frac{x}{2}\right)^3 + C$
3	$\int \csc^5 x \cos^3 x dx = \int \frac{\cos^3 x}{\sin^5 x} dx = \int \cot^3 x \csc^2 x dx$ $u = \cot x \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\csc^2 x \Rightarrow dx = \frac{du}{-\csc^2 x}$ $\int \csc^5 x \cos^3 x dx = \int \cot^3 x \csc^2 x dx$ $= \int u^3 \csc^2 x \frac{du}{-\csc^2 x} = \int -u^3 du = -\frac{1}{4} u^4 + C$ $= -\frac{1}{4} \cot^4 x + C$
4	$u = x^2 \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$ $\int x \sin x^2 dx = \int \frac{1}{2} \sin u du = -\frac{1}{2} \cos u + C = -\frac{1}{2} \cos x^2 + C$
5	$u = x + 2 \Rightarrow dx = du, \quad x = u - 2$ $\int x^3 (x + 2)^7 dx = \int (u - 2)^3 u^7 du = \int (u^{10} - 6u^9 + 12u^8 - 8u^7) du$ $= \frac{1}{11} u^{11} - \frac{3}{5} u^{10} + \frac{4}{3} u^9 - u^8 + C$ $= \frac{1}{11} (x + 2)^{11} - \frac{3}{5} (x + 2)^{10} + \frac{4}{3} (x + 2)^9 - (x + 2)^8 + C$



6	$\int \frac{\ln \sqrt{x}}{x} dx = \int \frac{\frac{1}{2} \ln x}{x} dx$ $u = \ln x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{x} \Rightarrow dx = x du$ $\int \frac{\ln \sqrt{x}}{x} dx = \int \frac{\frac{1}{2} \ln x}{x} dx = \int \frac{1}{2} u du = \frac{1}{4} u^2 + C = \frac{1}{4} (\ln x)^2 + C$
7	$u = \sqrt{x} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow dx = 2\sqrt{x} du$ $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{e^u}{\sqrt{x}} \times 2\sqrt{x} du = 2 \int e^u du = 2e^u + C = 2e^{\sqrt{x}} + C$
8	$\int \frac{\sin(\ln 4x^2)}{x} dx$ $u = \ln 4x^2 \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{8x}{4x^2} = \frac{2}{x} \Rightarrow dx = \frac{x}{2} du$ $\int \frac{\sin(\ln 4x^2)}{x} dx = \int \frac{\sin u}{x} \times \frac{x}{2} du$ $= \frac{1}{2} \int \sin u du = -\frac{1}{2} \cos u + C$ $= -\frac{1}{2} \cos(\ln 4x^2) + C$



$$u = \tan x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \sec^2 x \Rightarrow \sec^2 x dx = du$$

$$\int \sec^2 x \cos^3(\tan x) dx = \int \cos^3 u du = \int \cos u \cos^2 u du$$

$$= \int \cos u (1 - \sin^2 u) du$$

$$v = \sin u \Rightarrow \frac{dv}{du} = \cos u \Rightarrow \cos u du = dv$$

$$\int \cos u (1 - \sin^2 u) du = \int (1 - v^2) dv = v - \frac{1}{3} v^3 + C$$

$$= \sin u - \frac{1}{3} \sin^3 u + C$$

$$= \sin(\tan x) - \frac{1}{3} \sin^3(\tan x) + C$$

ملحوظة: يمكن إيجاد هذا التكامل بإعادة كتابته على الصورة:

$$\int \sec^2 x \cos(\tan x) (1 - \sin^2(\tan x)) dx$$

وبتعويض واحد فقط هو $u = \sin(\tan x)$

$$u = 4x + 1 \Rightarrow 4dx = du, \quad 4x = u - 1$$

$$x = 20 \Rightarrow u = 81$$

$$x = 6 \Rightarrow u = 25$$

$$\int_6^{20} \frac{8x}{\sqrt{4x+1}} dx = \int_{25}^{81} \frac{u-1}{2\sqrt{u}} du = \int_{25}^{81} \left(\frac{1}{2} u^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} \right) du$$

$$= \left(\frac{1}{3} u^{\frac{3}{2}} - u^{\frac{1}{2}} \right) \Big|_{25}^{81} = (243 - 9) - \left(\frac{125}{3} - 5 \right) = \frac{592}{3}$$

ملاحظة: يمكن التوصل إلى النتيجة نفسها بافتراض أن $u = \sqrt{4x+1}$

$$u = \sqrt{x-1} \Rightarrow u^2 = x-1 \Rightarrow 2udu = dx$$

$$x = 5 \Rightarrow u = 2$$

$$x = 2 \Rightarrow u = 1$$

$$\int_2^5 \frac{1}{1+\sqrt{x-1}} dx = \int_1^2 \frac{2u}{1+u} du = \int_1^2 \left(2 - \frac{2}{u+1} \right) du$$

$$= (2u - 2 \ln|u+1|) \Big|_1^2 = (4 - 2 \ln 3) - (2 - 2 \ln 2) = 2 + 2 \ln \frac{2}{3}$$

ملاحظة: يمكن التوصل إلى النتيجة نفسها بافتراض أن $u = 1 + \sqrt{x-1}$



12	$u = 1 + \cos x \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\sin x \Rightarrow dx = \frac{du}{-\sin x}$ $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 1$ $x = 0 \Rightarrow u = 2$ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{1 + \cos x} dx = \int_2^1 \frac{2 \sin x \cos x}{u} \times \frac{du}{-\sin x} = \int_2^1 \frac{2(u-1)}{u} du$ $= \int_2^1 \frac{2-2u}{u} du = \int_1^2 \frac{2u-2}{u} du = \int_1^2 \left(2 - \frac{2}{u}\right) du$ $= (2u - 2 \ln u) _1^2 = (4 - 2 \ln 2) - (2 - 0) = 2 - 2 \ln 2$
13	$u = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow dx = 2\sqrt{x} du$ $x = 4 \Rightarrow u = 3$ $x = 1 \Rightarrow u = 2$ $\int_1^4 \frac{(1 + \sqrt{x})^3}{\sqrt{x}} dx = \int_2^3 \frac{u^3}{\sqrt{x}} \times 2\sqrt{x} du = \int_2^3 2u^3 du = \frac{1}{2} u^4 \Big _2^3 = \frac{81}{2} - \frac{16}{2} = \frac{65}{2}$
14	$u = \tan x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \sec^2 x \Rightarrow dx = \frac{du}{\sec^2 x} = \cos^2 x du$ $x = \frac{\pi}{4} \Rightarrow u = 1$ $x = 0 \Rightarrow u = 0$ $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{\tan x}}{\cos^2 x} dx = \int_0^1 \frac{e^u}{\cos^2 x} \times \cos^2 x du = \int_0^1 e^u du = e^u \Big _0^1 = e - 1$



15	$u = \cos x \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\sin x \Rightarrow dx = \frac{du}{-\sin x}$ $x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ $x = 0 \Rightarrow u = 1$ $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \cos^2 x \sin^3 x \, dx = \int_1^{\frac{1}{2}} u^2 \sin^3 x \times \frac{du}{-\sin x} = \int_{\frac{1}{2}}^1 u^2 (1 - u^2) \, du$ $= \int_{\frac{1}{2}}^1 (u^2 - u^4) \, du = \left(\frac{1}{3} u^3 - \frac{1}{5} u^5 \right) \Big _{\frac{1}{2}}^1 = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) - \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{160} \right) = \frac{47}{480}$
16	$x\sqrt{1+x} = 0 \Rightarrow x = 0, x = -1$ $A = - \int_{-1}^0 f(x) \, dx = \int_{-1}^0 -x\sqrt{1+x} \, dx$ $u = 1 + x \Rightarrow dx = du, \quad x = u - 1$ $x = 0 \Rightarrow u = 1$ $x = -1 \Rightarrow u = 0$ $A = \int_{-1}^0 -x\sqrt{1+x} \, dx = \int_0^1 -x\sqrt{u} \, du = \int_0^1 (1-u)\sqrt{u} \, du$ $= \int_0^1 \left(u^{\frac{1}{2}} - u^{\frac{3}{2}} \right) \, du = \left(\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5} u^{\frac{5}{2}} \right) \Big _0^1 = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} = \frac{4}{15}$



$$f(x) = \int 16 \sin x \cos^3 x dx$$

$$u = \cos x \Rightarrow \frac{du}{dx} = -\sin x \Rightarrow dx = \frac{du}{-\sin x}$$

$$f(x) = \int 16 \sin x u^3 \times \frac{du}{-\sin x} = \int -16 u^3 du = -4u^4 + C$$

$$= -4\cos^4 x + C$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^4 + C$$

$$0 = -1 + C \Rightarrow C = 1$$

$$\Rightarrow f(x) = -4\cos^4 x + 1$$

$$f(x) = \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5}} dx$$

$$u = x^2 + 5 \Rightarrow \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$$

$$f(x) = \int \frac{x}{\sqrt{u}} \times \frac{du}{2x} = \int \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} du = u^{\frac{1}{2}} + C = \sqrt{x^2 + 5} + C$$

$$f(2) = 3 + C$$

$$1 = 3 + C \Rightarrow C = -2$$

$$\Rightarrow f(x) = \sqrt{x^2 + 5} - 2$$



$$s(t) = \int \frac{-2t}{(1+t^2)^{\frac{3}{2}}} dx$$

$$u = 1 + t^2 \Rightarrow \frac{du}{dt} = 2t \Rightarrow dt = \frac{du}{2t}$$

$$19 \quad s(t) = \int \frac{-2t}{u^{\frac{3}{2}}} \times \frac{du}{2t} = \int -u^{-\frac{3}{2}} du = 2u^{-\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{\sqrt{1+t^2}} + C$$

$$s(0) = 2 + C$$

$$4 = 2 + C \Rightarrow C = 2$$

$$\Rightarrow s(t) = \frac{2}{\sqrt{1+t^2}} + 2$$



$$\frac{4}{x^2 + 4x} = \frac{4}{x(x+4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+4}$$

$$A(x+4) + B(x) = 4$$

$$1 \quad x = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$x = -4 \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{4}{x^2 + 4x} dx = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+4} \right) dx = \ln|x| - \ln|x+4| + C = \ln \left| \frac{x}{x+4} \right| + C$$

$$\frac{6}{x^2 - 9} = \frac{6}{(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3}$$

$$A(x+3) + B(x-3) = 6$$

$$2 \quad x = 3 \Rightarrow A = 1$$

$$x = -3 \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{6}{x^2 - 9} dx = \int \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x+3} \right) dx$$

$$= \ln|x-3| - \ln|x+3| + C = \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C$$

$$\frac{x^2 - 3x + 8}{x^3 - 3x - 2} = \frac{x^2 - 3x + 8}{(x-2)(x+1)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$A(x+1)^2 + B(x-2)(x+1) + C(x-2) = x^2 - 3x + 8$$

$$x = 2 \Rightarrow A = \frac{2}{3}$$

$$x = -1 \Rightarrow C = -4$$

$$3 \quad x = 0 \Rightarrow A - 2B - 2C = 8 \Rightarrow \frac{2}{3} - 2B + 8 = 8 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

$$\int \frac{x^2 - 3x + 8}{x^3 - 3x - 2} dx = \int \left(\frac{\frac{2}{3}}{x-2} + \frac{\frac{1}{3}}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2} \right) dx$$

$$= \frac{2}{3} \ln|x-2| + \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{4}{x+1} + C$$



$$\frac{x-10}{x^2-2x-8} = \frac{x-10}{(x-4)(x+2)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+2}$$

$$A(x+2) + B(x-4) = x-10$$

$$x=4 \Rightarrow A=-1$$

$$x=-2 \Rightarrow B=2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x-10}{x^2-2x-8} dx &= \int \left(-\frac{1}{x-4} + \frac{2}{x+2} \right) dx \\ &= -\ln|x-4| + 2\ln|x+2| + C \end{aligned}$$

$$\frac{2x^2+6x-2}{2x^2+x-1} = 1 + \frac{5x-1}{2x^2+x-1} = 1 + \frac{5x-1}{(x+1)(2x-1)}$$

$$= 1 + \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x-1}$$

$$A(2x-1) + B(x+1) = 5x-1$$

$$x=-1 \Rightarrow A=2$$

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow B=1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2+6x-2}{2x^2+x-1} dx &= \int \left(1 + \frac{2}{x+1} + \frac{1}{2x-1} \right) dx \\ &= x + 2\ln|x+1| + \frac{1}{2}\ln|2x-1| + C \end{aligned}$$

$$\frac{2x^2-x+6}{(x^2+2)(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+2}$$

$$A(x^2+2) + (Bx+C)(x+1) = 2x^2-x+6$$

$$x=-1 \Rightarrow A=3$$

$$x=0 \Rightarrow 2A+C=6 \Rightarrow 6+C=6 \Rightarrow C=0$$

$$x=1 \Rightarrow 3A+2B+2C=7 \Rightarrow 9+2B=7 \Rightarrow B=-1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2-x+6}{(x^2+2)(x+1)} dx &= \int \left(\frac{3}{x+1} + \frac{-x}{x^2+2} \right) dx \\ &= 3\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln(x^2+2) + C \end{aligned}$$



$$\frac{8x + 24}{(x + 1)(x - 3)^2} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 3} + \frac{C}{(x - 3)^2}$$

$$A(x - 3)^2 + B(x + 1)(x - 3) + C(x + 1) = 8x + 24$$

$$x = -1 \Rightarrow A = 1$$

$$x = 3 \Rightarrow C = 12$$

$$x = 0 \Rightarrow 9A - 3B + C = 24 \Rightarrow 9 - 3B + 12 = 24 \Rightarrow B = -1$$

$$\int \frac{8x + 24}{(x + 1)(x - 3)^2} dx = \int \left(\frac{1}{x + 1} + \frac{-1}{x - 3} + \frac{12}{(x - 3)^2} \right) dx$$

$$= \ln|x + 1| - \ln|x - 3| - \frac{12}{x - 3} + C$$

$$= \ln \left| \frac{x + 1}{x - 3} \right| - \frac{12}{x - 3} + C$$

$$\frac{8x}{x^3 + x^2 - x - 1} = \frac{8x}{x^2(x + 1) - (x + 1)} = \frac{8x}{(x^2 - 1)(x + 1)} = \frac{8x}{(x - 1)(x + 1)^2}$$

$$= \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{(x + 1)^2} + \frac{C}{x - 1}$$

$$A(x + 1)(x - 1) + B(x - 1) + C(x + 1)^2 = 8x$$

$$x = -1 \Rightarrow B = 4$$

$$x = 1 \Rightarrow C = 2$$

$$x = 0 \Rightarrow -A - B + C = 0 \Rightarrow -A - 4 + 2 = 0 \Rightarrow A = -2$$

$$\int \frac{8x}{x^3 + x^2 - x - 1} dx = \int \left(\frac{-2}{x + 1} + \frac{4}{(x + 1)^2} + \frac{2}{x - 1} \right) dx$$

$$= -2 \ln|x + 1| - \frac{4}{x + 1} + 2 \ln|x - 1| + C = 2 \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| - \frac{4}{x + 1} + C$$



$$\frac{4}{x^3 - 2x^2} = \frac{4}{x^2(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2}$$

$$A(x)(x-2) + B(x-2) + C(x^2) = 4$$

$$x = 0 \Rightarrow B = -2$$

$$x = 2 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow -A - B + C = 4 \Rightarrow -A + 2 + 1 = 4 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{4}{x^3 - 2x^2} dx = \int \left(\frac{-1}{x} + \frac{-2}{x^2} + \frac{1}{x-2} \right) dx$$

$$= -\ln|x| + \frac{2}{x} + \ln|x-2| + C = \ln \left| \frac{x-2}{x} \right| + \frac{2}{x} + C$$

$$\frac{x-1}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$$

$$A(x)(x+1) + B(x+1) + C(x^2) = x-1$$

$$x = 0 \Rightarrow B = -1$$

$$x = -1 \Rightarrow C = -2$$

$$x = 1 \Rightarrow 2A + 2B + C = 0 \Rightarrow 2A - 2 - 2 = 0 \Rightarrow A = 2$$

$$\int_1^5 \frac{x-1}{x^2(x+1)} dx = \int_1^5 \left(\frac{2}{x} + \frac{-1}{x^2} + \frac{-2}{x+1} \right) dx$$

$$= \left(2\ln|x| + \frac{1}{x} - 2\ln|x-2| \right) \Big|_1^5 = \left(\frac{1}{x} + 2\ln \left| \frac{x}{x-2} \right| \right) \Big|_1^5 = 2\ln \frac{5}{3} - \frac{4}{5}$$



$$\frac{4-x}{(x-2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2}$$

$$A(x-2) + B = 4-x$$

$$x=2 \Rightarrow B=2$$

$$11 \quad x=0 \Rightarrow -2A+B=4 \Rightarrow -2A+2=4 \Rightarrow A=-1$$

$$\int_7^{12} \frac{4-x}{(x-2)^2} dx = \int_7^{12} \left(\frac{-1}{x-2} + \frac{2}{(x-2)^2} \right) dx$$

$$= \left(-\ln|x-2| - \frac{2}{x-2} \right) \Big|_7^{12} = -\ln 10 - \frac{1}{5} + \ln 5 + \frac{2}{5} = \frac{1}{5} + \ln \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{x^2+8x+15} = \frac{4}{(x+5)(x+3)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x+3}$$

$$A(x+3) + B(x+5) = 4$$

$$x=-5 \Rightarrow A=-2$$

$$x=-3 \Rightarrow B=2$$

$$12 \quad \int_1^2 \frac{4}{x^2+8x+15} dx = \int_1^2 \left(\frac{-2}{x+5} + \frac{2}{x+3} \right) dx$$

$$= (-2 \ln|x+5| + 2 \ln|x+3|) \Big|_1^2 = \left(2 \ln \left| \frac{x+3}{x+5} \right| \right) \Big|_1^2$$

$$= 2 \ln \frac{5}{7} - 2 \ln \frac{2}{3} = 2 \ln \frac{15}{14}$$



$$\frac{10x^2 - 26x + 10}{2x^2 - 5x} = 5 + \frac{-x + 10}{2x^2 - 5x} = 5 + \frac{10 - x}{x(2x - 5)} = 5 + \frac{A}{x} + \frac{B}{2x - 5}$$

$$A(2x - 5) + B(x) = 10 - x$$

$$x = 0 \Rightarrow A = -2$$

13

$$x = \frac{5}{2} \Rightarrow B = 3$$

$$\int_1^2 \frac{10x^2 - 26x + 10}{2x^2 - 5x} dx = \int_1^2 \left(5 + \frac{-2}{x} + \frac{3}{2x - 5} \right) dx$$

$$= \left(5x - 2 \ln|x| + \frac{3}{2} \ln|2x - 5| \right) \Big|_1^2 = 10 - 2 \ln 2 - 5 - \frac{3}{2} \ln 3 = 5 - \ln 12\sqrt{3}$$

$$\frac{25}{(x+1)(2x-3)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{2x-3} + \frac{C}{(2x-3)^2}$$

$$A(2x-3)^2 + B(x+1)(2x-3) + C(x+1) = 25$$

$$x = -1 \Rightarrow A = 1$$

$$x = \frac{3}{2} \Rightarrow C = 10$$

14

$$x = 0 \Rightarrow 9A - 3B + C = 25 \Rightarrow 9 - 3B + 10 = 25 \Rightarrow B = -2$$

$$\int_2^5 \frac{25}{(x+1)(2x-3)^2} dx = \int_2^5 \left(\frac{1}{x+1} + \frac{-2}{2x-3} + \frac{10}{(2x-3)^2} \right) dx$$

$$= \left(\ln|x+1| - \ln|2x-3| - \frac{5}{2x-3} \right) \Big|_2^5 = \left(\ln \left| \frac{x+1}{2x-3} \right| - \frac{5}{2x-3} \right) \Big|_2^5$$

$$= \left(\ln \frac{6}{7} - \frac{5}{7} \right) - \left(\ln 3 - 5 \right) = \frac{30}{7} + \ln \frac{2}{7}$$



$$\frac{x^2 - 3x + 10}{x^2 - x - 6} = 1 + \frac{16 - 2x}{x^2 - x - 6} = 1 + \frac{16 - 2x}{(x - 3)(x + 2)} = 1 + \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x + 2}$$

$$A(x + 2) + B(x - 3) = 16 - 2x$$

$$x = 3 \Rightarrow A = 2$$

$$15 \quad x = -2 \Rightarrow B = -4$$

$$\int_0^2 \frac{x^2 - 3x + 10}{x^2 - x - 6} dx = \int_0^2 \left(1 + \frac{2}{x - 3} + \frac{-4}{x + 2} \right) dx$$

$$= (x + 2 \ln|x - 3| - 4 \ln|x + 2|) \Big|_0^2$$

$$= 2 - 4 \ln 4 - 2 \ln 3 + 4 \ln 2 = 2 - 2 \ln 12$$

$$A = \int_1^2 \frac{4x + 3}{(x + 2)(2x - 1)} dx$$

$$\frac{4x + 3}{(x + 2)(2x - 1)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{2x - 1}$$

$$A(2x - 1) + B(x + 2) = 4x + 3$$

$$x = -2 \Rightarrow A = 1$$

$$16 \quad x = \frac{1}{2} \Rightarrow B = 2$$

$$A = \int_1^2 \frac{4x + 3}{(x + 2)(2x - 1)} dx = \int_1^2 \left(\frac{1}{x + 2} + \frac{2}{2x - 1} \right) dx$$

$$= (\ln|x + 2| + \ln|2x - 1|) \Big|_1^2$$

$$= (\ln 4 + \ln 3) - (\ln 3 + 0) = \ln 4$$



$$A = \int_2^3 \frac{x^3 + 3x^2 - 7x}{(x+2)(2x-2)^2} dx$$

$$\frac{x^3 + 3x^2 - 7x}{(x+2)(2x-2)^2} = \frac{x^3 + 3x^2 - 7x}{4x^3 - 12x + 8} = \frac{1}{4} + \frac{3x^2 - 4x - 2}{4x^3 - 12x + 8}$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{3x^2 - 4x - 2}{(x+2)(2x-2)^2} = \frac{1}{4} + \frac{A}{x+2} + \frac{B}{2x-2} + \frac{C}{(2x-2)^2}$$

$$A(2x-2)^2 + B(x+2)(2x-2) + C(x+2) = 3x^2 - 4x - 2$$

$$x = -2 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$17 \quad x = 1 \Rightarrow C = -1$$

$$x = 0 \Rightarrow 4A - 4B + 2C = -2 \Rightarrow 2 - 4B - 2 = -2 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$A = \int_2^3 \frac{x^3 + 3x^2 - 7x}{(x+2)(2x-2)^2} dx = \int_2^3 \left(\frac{1}{4} + \frac{\frac{1}{2}}{x+2} + \frac{\frac{1}{2}}{2x-2} + \frac{-1}{(2x-2)^2} \right) dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} \ln|x+2| + \frac{1}{4} \ln|2x-2| + \frac{1}{2(2x-2)} \right) \Big|_2^3$$

$$= \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \ln 5 + \frac{1}{4} \ln 4 + \frac{1}{8} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 4 + \frac{1}{4} \ln 2 + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \ln \frac{25}{8}$$



$$u = e^x \Rightarrow du = e^x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{e^x}$$

$$\int \frac{e^{2x} + e^x}{(e^{2x} + 1)(e^x - 1)} dx = \int \frac{e^x(u + 1)}{(u^2 + 1)(u - 1)} \times \frac{du}{e^x} = \int \frac{u + 1}{(u^2 + 1)(u - 1)} du$$

$$\frac{u + 1}{(u^2 + 1)(u - 1)} = \frac{Au + B}{u^2 + 1} + \frac{C}{u - 1}$$

$$(Au + B)(u - 1) + C(u^2 + 1) = u + 1$$

18

$$u = 1 \Rightarrow C = 1$$

$$u = 0 \Rightarrow -B + C = 1 \Rightarrow -B + 1 = 1 \Rightarrow B = 0$$

$$u = -1 \Rightarrow 2A - 2B + 2C = 0 \Rightarrow 2A + 2 = 0 \Rightarrow A = -1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x} + e^x}{(e^{2x} + 1)(e^x - 1)} dx &= \int \left(\frac{-u}{u^2 + 1} + \frac{1}{u - 1} \right) du \\ &= -\frac{1}{2} \ln(u^2 + 1) + \ln|u - 1| + C = -\frac{1}{2} \ln(e^{2x} + 1) + \ln|e^x - 1| + C \end{aligned}$$

$$u = \sin x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \cos x \Rightarrow dx = \frac{du}{\cos x}$$

$$\int \frac{5 \cos x}{\sin^2 x + 3 \sin x - 4} dx = \int \frac{5 \cos x}{u^2 + 3u - 4} \times \frac{du}{\cos x} = \int \frac{5}{u^2 + 3u - 4} du$$

$$\frac{5}{u^2 + 3u - 4} = \frac{5}{(u + 4)(u - 1)} = \frac{A}{u + 4} + \frac{B}{u - 1}$$

$$A(u - 1) + B(u + 4) = 5$$

19

$$u = 1 \Rightarrow B = 1$$

$$u = -4 \Rightarrow A = -1$$

$$\int \frac{5}{u^2 + 3u - 4} du = \int \left(\frac{-1}{u + 4} + \frac{1}{u - 1} \right) du = -\ln|u + 4| + \ln|u - 1| + C$$

$$\Rightarrow \int \frac{5 \cos x}{\sin^2 x + 3 \sin x - 4} dx = -\ln(4 + \sin x) + \ln|-1 + \sin x| + C$$

$$= \ln \left| \frac{-1 + \sin x}{4 + \sin x} \right| + C$$



$$u = \tan x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \sec^2 x \Rightarrow du = \sec^2 x dx$$

$$\int \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 5 \tan x + 6} dx = \int \frac{1}{u^2 + 5u + 6} du$$

$$\frac{1}{u^2 + 5u + 6} = \frac{1}{(u+3)(u+2)} = \frac{A}{u+3} + \frac{B}{u+2}$$

$$A(u+2) + B(u+3) = 1$$

$$u = -3 \Rightarrow A = -1$$

$$u = -2 \Rightarrow B = 1$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{u^2 + 5u + 6} du = \int \left(\frac{-1}{u+3} + \frac{1}{u+2} \right) du = \ln|u+2| - \ln|u+3| + C$$

$$\Rightarrow \int \frac{\sec^2 x}{\tan^2 x + 5 \tan x + 6} dx = \ln \left| \frac{2 + \tan x}{3 + \tan x} \right| + C$$

$$\frac{4x}{x^2 - 2x - 3} = \frac{4x}{(x-3)(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+1}$$

$$A(x+1) + B(x-3) = 4x$$

$$x = 3 \Rightarrow A = 3$$

$$x = -1 \Rightarrow B = 1$$

$$\int_0^1 \frac{4x}{x^2 - 2x - 3} dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{x-3} + \frac{1}{x+1} \right) dx = (3 \ln|x-3| + \ln|x+1|) \Big|_0^1$$

$$= (3 \ln 2 + \ln 2) - (3 \ln 3) = \ln 8 + \ln 2 - \ln 27 = \ln \frac{16}{27}$$



$$\frac{1}{2x^2 + x - 1} = \frac{1}{(2x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{2x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

$$A(x + 1) + B(2x - 1) = 1$$

$$x = -1 \Rightarrow B = -\frac{1}{3}$$

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow A = \frac{2}{3}$$

$$\int_1^p \frac{1}{2x^2 + x - 1} dx = \int_1^p \left(\frac{\frac{2}{3}}{2x - 1} + \frac{-\frac{1}{3}}{x + 1} \right) dx$$

$$= \left(\frac{1}{3} \ln|2x - 1| - \frac{1}{3} \ln|x + 1| \right) \Big|_1^p = \left(\frac{1}{3} \ln|2p - 1| - \frac{1}{3} \ln|p + 1| \right) - \left(-\frac{1}{3} \ln 2 \right)$$

$$= \frac{1}{3} \ln \left| \frac{2(2p - 1)}{p + 1} \right| = \frac{1}{3} \ln \left(\frac{4p - 2}{p + 1} \right), p > 1$$



1	$u = x$ $du = dx$ $dv = \cos 4x dx$ $v = \frac{1}{4} \sin 4x$ $\int x \cos 4x dx = \frac{1}{4} x \sin 4x - \int \frac{1}{4} \sin 4x dx = \frac{1}{4} x \sin 4x + \frac{1}{16} \cos 4x + C$
2	$u = x$ $du = dx$ $dv = (x+1)^{\frac{1}{2}} dx$ $v = \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}}$ $\int x \sqrt{x+1} dx = \frac{2}{3} x (x+1)^{\frac{3}{2}} - \int \frac{2}{3} (x+1)^{\frac{3}{2}} dx$ $= \frac{2}{3} x (x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{4}{15} (x+1)^{\frac{5}{2}} + C$
3	$u = x$ $du = dx$ $dv = e^{-x} dx$ $v = -e^{-x}$ $\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} - \int -e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$
4	$u = \ln x$ $du = \frac{1}{x} dx$ $dv = (x^2 + 1) dx$ $v = \frac{1}{3} x^3 + x$ $\int (x^2 + 1) \ln x dx = \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \ln x - \int \frac{1}{x} \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) dx$ $= \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \ln x - \int \left(\frac{1}{3} x^2 + 1 \right) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \ln x - \frac{1}{9} x^3 - x + C$
5	$\int \ln x^3 dx = \int 3 \ln x dx$ $u = 3 \ln x$ $du = \frac{3}{x} dx$ $dv = dx$ $v = x$ $\int 3 \ln x dx = 3x \ln x - \int 3 dx = 3x \ln x - 3x + C$



	$u = e^{2x}$ $du = 2e^{2x} dx$ $dv = \sin x dx$ $v = -\cos x$ $\int e^{2x} \sin x dx = -e^{2x} \cos x + \int 2e^{2x} \cos x dx$
6	$u = 2e^{2x}$ $du = 4e^{2x} dx$ $dv = \cos x dx$ $v = \sin x$ $\Rightarrow \int e^{2x} \sin x dx = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - \int 4e^{2x} \sin x dx$ $\Rightarrow \int e^{2x} \sin x dx = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - 4 \int e^{2x} \sin x dx$ $\Rightarrow 5 \int e^{2x} \sin x dx = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x + C$ $\Rightarrow \int e^{2x} \sin x dx = -\frac{1}{5} e^{2x} \cos x + \frac{2}{5} e^{2x} \sin x + C$ $\Rightarrow \int e^{2x} \sin x dx = \frac{1}{5} e^{2x} (2 \sin x - \cos x) + C$
7	$u = \ln x$ $du = \frac{1}{x} dx$ $dv = dx$ $v = x$ $\int_1^e \ln x dx = x \ln x \Big _1^e - \int_1^e dx = x \ln x \Big _1^e - x \Big _1^e = e - e + 1 = 1$
8	$u = \ln x$ $du = \frac{1}{x} dx$ $dv = x^{-2} dx$ $v = \frac{-1}{x}$ $\int_1^2 \frac{\ln x}{x^2} dx = -\frac{\ln x}{x} \Big _1^2 + \int_1^2 x^{-2} dx = -\frac{\ln x}{x} \Big _1^2 - \frac{1}{x} \Big _1^2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2$



National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development
	$u = x$ $du = dx$	$dv = \cos \frac{1}{4}x dx$ $v = 4 \sin \frac{1}{4}x$			
	9 $\int_0^{\pi} x \cos \frac{1}{4}x dx = 4x \sin \frac{1}{4}x \Big _0^{\pi} - \int_1^2 4 \sin \frac{1}{4}x dx$ $= 4x \sin \frac{1}{4}x \Big _0^{\pi} + 16 \cos \frac{1}{4}x \Big _0^{\pi}$ $= \frac{4\pi}{\sqrt{2}} + \frac{16}{\sqrt{2}} - 16 = 2\sqrt{2}\pi + 8\sqrt{2} - 16$				
	$u = e^{3x}$ $du = 3e^{3x} dx$	$dv = \cos 2x dx$ $v = \frac{1}{2} \sin 2x$			
	$\int e^{3x} \cos 2x dx = \frac{1}{2} e^{3x} \sin 2x - \int \frac{3}{2} e^{3x} \sin 2x dx$ $u = \frac{3}{2} e^{3x}$ $du = \frac{9}{2} e^{3x} dx$	$dv = \sin 2x dx$ $v = -\frac{1}{2} \cos 2x$	10 $\Rightarrow \int e^{3x} \cos 2x dx = \frac{1}{2} e^{3x} \sin 2x + \frac{3}{4} e^{3x} \cos 2x - \int \frac{9}{4} e^{3x} \cos 2x dx$ $\Rightarrow \int e^{3x} \cos 2x dx = \frac{1}{2} e^{3x} \sin 2x + \frac{3}{4} e^{3x} \cos 2x - \frac{9}{4} \int e^{3x} \cos 2x dx$ $\Rightarrow \frac{13}{4} \int e^{3x} \cos 2x dx = \frac{1}{2} e^{3x} \sin 2x + \frac{3}{4} e^{3x} \cos 2x + C$ $\Rightarrow \int e^{3x} \cos 2x dx = \frac{2}{13} e^{3x} \sin 2x + \frac{3}{13} e^{3x} \cos 2x + C$ $\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{3x} \cos 2x dx = \frac{1}{13} (2e^{3x} \sin 2x + 3e^{3x} \cos 2x) \Big _0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{13} (2e^{\frac{3\pi}{4}} - 3)$		



$$u = \ln(x + 1)$$

$$du = \frac{1}{x+1} dx$$

$$dv = dx$$

$$v = x$$

$$\int_1^e \ln(x+1) dx = x \ln(x+1) \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x}{x+1} dx$$

$$= x \ln(x+1) \Big|_1^e - \int_1^e \left(1 + \frac{-1}{x+1}\right) dx$$

$$= x \ln(x+1) \Big|_1^e - (x - \ln(x+1)) \Big|_1^e$$

$$= e \ln(e+1) - \ln 2 - (e - \ln(e+1)) + (1 - \ln 2)$$

$$= (1+e) \ln(e+1) - 2 \ln 2 - e + 1$$

$$\int x^2 e^x dx$$

سنستخدم هنا طريقة الجدول:

$f(x)$ ومشتقاته المتكررة

$g(x)$ وتكاملاته المتكررة

x^2	+	e^x
$2x$	-	e^x
2	+	e^x
0		e^x

$$\Rightarrow \int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C$$

$$\Rightarrow \int_0^1 x^2 e^x dx = e^x (x^2 - 2x + 2) \Big|_0^1 = e - 2$$

$$u = \ln x$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$dv = dx$$

$$v = x$$

$$\int_2^4 \ln x dx = x \ln x \Big|_2^4 - \int_2^4 dx = x \ln x \Big|_2^4 - x \Big|_2^4$$

$$= 4 \ln 4 - 2 \ln 2 - 2 = 8 \ln 2 - 2 \ln 2 - 2 = 6 \ln 2 - 2$$



14	إن الإحداثيين x للنقطتين A, B هما أول حلين موجبين للمعادلة: $x \sin x = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pi, x = 2\pi, \dots$ ومنه: $A(\pi, 0), B(2\pi, 0)$
15	$Area = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx + \left(-\int_{\pi}^{2\pi} x \sin x \, dx\right)$ $u = x \quad dv = \sin x \, dx$ $du = dx \quad v = -\cos x$ $\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x + C$ $Area = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx + \left(-\int_{\pi}^{2\pi} x \sin x \, dx\right)$ $= (-x \cos x + \sin x) \Big _0^{\pi} + (x \cos x - \sin x) \Big _{\pi}^{2\pi}$ $= \pi + 2\pi - (-\pi) = 4\pi$
16	$f(x) = 0 \Rightarrow x^2 \ln x = 0 \Rightarrow x = 0, x = 1$ $\Rightarrow A(1,0)$
17	$Area = \int_1^2 x^2 \ln x \, dx$ $u = \ln x \quad dv = x^2 \, dx$ $du = \frac{1}{x} \, dx \quad v = \frac{1}{3} x^3$ $Area = \int_1^2 x^2 \ln x \, dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x \Big _1^2 - \int_1^2 \frac{1}{3} x^2 \, dx$ $= \frac{1}{3} x^3 \ln x \Big _1^2 - \frac{1}{9} x^3 \Big _1^2$ $= \frac{8}{3} \ln 2 - \frac{8}{9} + \frac{1}{9} = \frac{8}{3} \ln 2 - \frac{7}{9}$



الدرس الخامس: المساحات والحجوم

1	$A = \int_0^{\pi} (2 - (1 + \cos 2x)) dx = \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big _0^{\pi} = (\pi - 0) - (0 - 0) = \pi$
2	$1 + 10x - 2x^2 = 1 + 5x - x^2 \Rightarrow x^2 - 5x = 0$ $\Rightarrow x(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 5$ $\Rightarrow A = \int_0^5 (1 + 10x - 2x^2 - (1 + 5x - x^2)) dx$ $= \int_0^5 (5x - x^2) dx = \left(\frac{5}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big _0^5 = \frac{125}{2} - \frac{125}{3} = \frac{125}{6}$
3	$A = \int_0^2 (3x - x^2 - (x)) dx = \int_0^2 (2x - x^2) dx$ $= \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big _0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$
4	$A = \int_{-1}^2 ((x^2 + 1) - (2x - 2)) dx = \int_{-1}^2 (x^2 - 2x + 3) dx$ $= \left(\frac{1}{3} x^3 - x^2 + 3x \right) \Big _{-1}^2 = \left(\frac{8}{3} - 4 + 6 \right) - \left(-\frac{1}{3} - 1 - 3 \right) = 9$
5	$x^2 = 2 - x \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = -2, x = 1$ $A = \int_{-2}^1 ((2 - x) - (x^2)) dx = \int_{-2}^1 (2 - x - x^2) dx$ $= \left(2x - \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big _{-2}^1 = \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(-4 - 2 + \frac{8}{3} \right) = \frac{9}{2}$
6	$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{x} \Rightarrow x^2 = x \Rightarrow x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 1$ لكن $x \neq 0$ لأن الاقترانين غير معرفين عند $x = 0$، إذن يتقاطع المنحنيان عند $x = 1$ فقط. $A = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) \Big _1^2 = \left(\ln 2 + \frac{1}{2} \right) - (1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$



$$1 - \cos x = \cos x \Rightarrow 2 \cos x = 1 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$$

$$\cos x > 1 - \cos x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{3}$$

$$\cos x < 1 - \cos x, \quad \frac{\pi}{3} < x < \pi$$

$$\begin{aligned} 7 \quad A &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\cos x - (1 - \cos x)) dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 - \cos x - (\cos x)) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (2 \cos x - 1) dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (1 - 2 \cos x) dx \end{aligned}$$

$$= (2 \sin x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} + (x - 2 \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3} + \pi - \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$$

$$3\sqrt{x} - \sqrt{x^3} + 4 = 4 - \frac{1}{2}x \Rightarrow 3\sqrt{x} - \sqrt{x^3} + \frac{1}{2}x = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} \left(3 - x + \frac{1}{2}\sqrt{x} \right) = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = 0, \quad x - \frac{1}{2}\sqrt{x} - 3 = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, \quad 2x - \sqrt{x} - 6 = 0$$

$$8 \quad \sqrt{x} = u \Rightarrow x = u^2, \quad \sqrt{x} > 0 \Rightarrow u > 0$$

$$2x - \sqrt{x} - 6 = 0 \Rightarrow 2u^2 - u - 6 = 0$$

$$(2u + 3)(u - 2) = 0 \Rightarrow u = -\frac{3}{2}, u = 2 \Rightarrow x = 4 \quad (\text{الحل السالب مرفوض})$$

$$\Rightarrow x = 0, \quad x = 4$$


$$\Rightarrow A(4, 2)$$

$$9 \quad A = \int_0^4 \left((3\sqrt{x} - \sqrt{x^3} + 4) - \left(4 - \frac{1}{2}x \right) \right) dx$$

$$= \int_0^4 \left(3\sqrt{x} - \sqrt{x^3} + \frac{1}{2}x \right) dx = \left(2x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{4}x^2 \right) \Big|_0^4$$

$$= 16 - \frac{64}{5} + 4 = \frac{36}{5} = 7.2$$



10	$s(7) - s(0) = \int_0^7 v(t) dt = -A_1 + A_2 - A_3$ $= -\frac{1}{2}(2)(1) + \frac{1}{2}(2)(4+1) - \frac{1}{2}(2)(1) = -1 + 5 - 1 = 3 \text{ m}$	
11	$d = \int_0^7 v(t) dt = A_1 + A_2 + A_3 = 1 + 5 + 1 = 7 \text{ m}$	
12	$s(7) - s(0) = 3 \text{ m} \Rightarrow s(7) - 2 = 3 \Rightarrow s(7) = 3 + 2 = 5 \text{ m}$	
13	$\frac{1}{2}x + 3 = \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+2) = 0 \Rightarrow x = 3, x = -2$ $V = \pi \int_0^3 \left((g(x))^2 - (f(x))^2 \right) dx = \pi \int_0^3 \left(\left(\frac{1}{2}x + 3 \right)^2 - \left(\frac{1}{2}x^2 \right)^2 \right) dx$ $= \pi \left(\frac{2}{3} \left(\frac{1}{2}x + 3 \right)^3 - \frac{1}{20}x^5 \right) \Big _0^3 = \frac{153\pi}{5}$	
14	$V = \pi \int_e^{e^3} (f(x))^2 dx = \pi \int_e^{e^3} \ln x dx$ $u = \ln x \quad dv = dx$ $du = \frac{1}{x} dx \quad v = x$ $V = \pi \int_e^{e^3} \ln x dx = \pi (x \ln x _e^{e^3} - \int_e^{e^3} dx) = \pi (x \ln x _e^{e^3} - x _e^{e^3})$ $= \pi (3e^3 - e - e^3 + e) = 2\pi e^3$	
15	$x^2 = \sqrt{8x} \Rightarrow x^4 = 8x \Rightarrow x^4 - 8x = 0 \Rightarrow x(x^3 - 8) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 2$ $V = \pi \int_0^2 \left((\sqrt{8x})^2 - (x^2)^2 \right) dx = \pi \int_0^2 (8x - x^4) dx$ $= \pi \left(4x^2 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big _0^2 = \pi \left(16 - \frac{32}{5} \right) = \frac{48\pi}{5} = 9.6\pi$	



$$y = 4 \Rightarrow x^2 + 16 = 25 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = -3, x = 3$$

$$x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y^2 = 25 - x^2$$

$$16 \quad V = \pi \int_{-3}^3 (y^2 - (4)^2) dx = \pi \int_{-3}^3 (25 - x^2 - 16) dx = \pi \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx$$

$$= \pi \left(9x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-3}^3 = \pi((27 - 9) - (-27 + 9)) = 36\pi$$



1	$\frac{dy}{dx} = 3x^2y \Rightarrow \frac{dy}{y} = 3x^2dx \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int 3x^2dx \Rightarrow \ln y = x^3 + C$
2	$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 4}{x} \Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y^2 - 4} \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2 - 4} = \int \frac{dx}{x}$ $\frac{1}{y^2 - 4} = \frac{1}{(y - 2)(y + 2)} = \frac{A}{y - 2} + \frac{B}{y + 2}$ $\Rightarrow A(y + 2) + B(y - 2) = 1$ $y = -2 \Rightarrow B = -\frac{1}{4}$ $y = 2 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$ $\Rightarrow \frac{1}{y^2 - 4} = \frac{\frac{1}{4}}{y - 2} + \frac{-\frac{1}{4}}{y + 2}$ $\int \frac{dy}{y^2 - 4} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \left(\frac{\frac{1}{4}}{y - 2} + \frac{-\frac{1}{4}}{y + 2} \right) dy = \int \frac{dx}{x}$ $\Rightarrow \frac{1}{4} \ln y - 2 - \frac{1}{4} \ln y + 2 = \ln x + C$ $\Rightarrow \frac{1}{4} \ln \left \frac{y - 2}{y + 2} \right = \ln x + C$
3	$\frac{dy}{dx} = e^{x+y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = e^x \times e^y \Rightarrow \frac{dy}{e^y} = e^x dx \Rightarrow \int \frac{dy}{e^y} = \int e^x dx$ $\Rightarrow \int e^{-y} dy = \int e^x dx \Rightarrow -e^{-y} = e^x + C$



$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \sec y}{y e^{x^2}} \Rightarrow \frac{y dy}{\sec y} = \frac{x dx}{e^{x^2}} \Rightarrow \int y \cos y dy = \int x e^{-x^2} dx$$

نجد $\int y \cos y dy$ بالأجزاء (من دون إضافة ثابت التكامل):

$$u = y \quad dv = \cos y dy$$

$$du = dy \quad v = \sin y$$

$$\Rightarrow \int y \cos y dy = y \sin y - \int \sin y dy = y \sin y + \cos y$$

نجد $\int x e^{-x^2} dx$ بالتعويض (من دون إضافة ثابت التكامل):

$$u = -x^2 \Rightarrow du = -2x dx \Rightarrow dx = -\frac{du}{2x}$$

$$\Rightarrow \int x e^{-x^2} dx = \int x e^u \times \frac{du}{-2x} = -\int \frac{1}{2} e^u du = -\frac{1}{2} e^u = -\frac{1}{2} e^{-x^2}$$

نضيف ثابت التكامل في الخطوة الأخيرة:

$$\int y \cos y dy = \int x e^{-x^2} dx$$

$$\Rightarrow y \sin y + \cos y = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y-3}{y} \Rightarrow \frac{y}{y-3} dy = dx \Rightarrow \int \frac{y}{y-3} dy = \int dx$$

$$\Rightarrow \int \left(1 + \frac{3}{y-3}\right) dy = \int dx$$

$$\Rightarrow y + 3 \ln|y-3| = x + C$$



$$\frac{dy}{dx} = \frac{x \ln x}{y^2} \Rightarrow y^2 dy = x \ln x dx \Rightarrow \int y^2 dy = \int x \ln x dx$$

نجد $\int x \ln x dx$ بالأجزاء:

$$u = \ln x$$

$$dv = x dx$$

$$du = \frac{1}{x} dx$$

$$v = \frac{1}{2} x^2$$

$$\Rightarrow \int x \ln x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \int \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2$$

$$\int y^2 dy = \int x \ln x dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} y^3 = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + C$$

$$\frac{dy}{dx} = -30 \cos 4x \sin 4x, y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 0$$

$$\Rightarrow dy = -30 \cos 4x \sin 4x dx$$

$$\Rightarrow \int dy = \int -15 \sin 8x dx$$

$$\Rightarrow y = \frac{15}{8} \cos 8x + C$$

الحل العام :

$$y\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{15}{8} \cos 8\left(\frac{\pi}{8}\right) + C$$

الشرط الأولي :

$$0 = -\frac{15}{8} + C \Rightarrow C = \frac{15}{8}$$

$$\Rightarrow y = \frac{15}{8} \cos 8x + \frac{15}{8}$$

الحل الخاص :



National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development
	$\frac{dy}{dx} = x^2\sqrt{y}$ $\Rightarrow \frac{dy}{\sqrt{y}} = x^2 dx$				
8	$\Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{y}} = \int x^2 dx$	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج
	$\Rightarrow 2\sqrt{y} = \frac{1}{3}x^3 + C$	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	الحل العام :	National Center for Curriculum Development
	$y(0) = 2 \Rightarrow 0 + C = 2\sqrt{2} \Rightarrow C = 2\sqrt{2}$			الشرط الأولي :	
	$\Rightarrow 2\sqrt{y} = \frac{1}{3}x^3 + 2\sqrt{2}$	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج	الحل الخاص :	المركز الوطني لتطوير المناهج
	$\frac{dy}{dx} = \frac{4\sqrt{x}}{\cos y}, y(0) = 0$	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development
9	$\Rightarrow \cos y dy = 4\sqrt{x} dx$	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج	الحل العام :	المركز الوطني لتطوير المناهج
	$\Rightarrow \int \cos y dy = \int 4\sqrt{x} dx$	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	الشرط الأولي :	National Center for Curriculum Development
	$\Rightarrow \sin y = \frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} + C$	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج	الحل الخاص :	المركز الوطني لتطوير المناهج
	$y(0) = 0 \Rightarrow 0 = 0 + C \Rightarrow C = 0$	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development		
	$\Rightarrow \sin y = \frac{8}{3}x\sqrt{x}$	المركز الوطني لتطوير المناهج	المركز الوطني لتطوير المناهج		



10	$\frac{dy}{dx} = xe^{y-x^2}, y(1) = 0$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = xe^y e^{-x^2} \Rightarrow \frac{dy}{e^y} = xe^{-x^2} dx$ $\Rightarrow \int \frac{dy}{e^y} = \int xe^{-x^2} dx$ نجد $\int xe^{-x^2} dx$ بالتعويض: $u = -x^2 \Rightarrow du = -2x dx \Rightarrow dx = \frac{du}{-2x}$ $\Rightarrow \int \frac{dy}{e^y} = \int xe^{-x^2} dx = \int xe^u \times \frac{du}{-2x} = \int -\frac{1}{2} e^u du = -\frac{1}{2} e^u = -\frac{1}{2} e^{-x^2}$ $-e^{-y} = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$ $\Rightarrow e^{-y} = \frac{1}{2} e^{-x^2} + C$ الحل العام: الشرط الأولي: $y(1) = 0 \Rightarrow 1 = \frac{1}{2e} + C \Rightarrow C = 1 - \frac{1}{2e}$ الحل الخاص: $\Rightarrow e^{-y} = \frac{1}{2} e^{-x^2} + 1 - \frac{1}{2e}$
11	$\frac{dy}{dx} = xe^{-y}, y(4) = \ln 2$ $\Rightarrow \frac{dy}{e^{-y}} = x dx$ $\Rightarrow \int e^y dy = \int x dx \Rightarrow e^y = \frac{1}{2} x^2 + C$ الحل العام: الشرط الأولي: $y(4) = \ln 2 \Rightarrow 2 = 8 + C \Rightarrow C = -6$ الحل الخاص: $\Rightarrow e^y = \frac{1}{2} x^2 - 6$
12	$\frac{dy}{dx} = (3x^2 + 4)y^2, y(2) = -0.1$ $\Rightarrow \frac{dy}{y^2} = (3x^2 + 4) dx$ $\Rightarrow \int y^{-2} dy = \int (3x^2 + 4) dx$ $\Rightarrow -\frac{1}{y} = x^3 + 4x + C$ الحل العام: الشرط الأولي: $y(2) = -0.1 \Rightarrow 10 = 8 + 8 + C \Rightarrow C = -6$ الحل الخاص: $\Rightarrow -\frac{1}{y} = x^3 + 4x - 6$



$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}y^{0.8}, y(0) = 100000$$

$$\Rightarrow y^{-0.8}dy = \frac{1}{2}dt$$

$$\Rightarrow \int y^{-0.8}dy = \int \frac{1}{2}dt$$

$$\Rightarrow 5y^{0.2} = \frac{1}{2}t + C$$

$$y(0) = 100000$$

$$\Rightarrow 5\sqrt[5]{100000} = 0 + C \Rightarrow C = 50$$

$$\Rightarrow 5\sqrt[5]{y} = \frac{1}{2}t + 50$$

الحل الخاص :

13

14

$$5\sqrt[5]{y} = \frac{1}{2}(7) + 50 \Rightarrow \sqrt[5]{y} = 10.7 \Rightarrow y = (10.7)^5 \approx 140255$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v^2}{100}, v(0) = 20$$

$$\Rightarrow -v^{-2}dv = \frac{1}{100}dt$$

$$\Rightarrow -\int v^{-2}dv = \int \frac{1}{100}dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{100}t + C$$

$$v(0) = 20 \Rightarrow \frac{1}{20} = 0 + C \Rightarrow C = \frac{1}{20}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{100}t + \frac{1}{20} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{t+5}{100} \Rightarrow v = \frac{100}{t+5}$$

15



$$e^y \frac{dy}{dx} = 10 + 2\sec^2 x, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$\Rightarrow e^y dy = (10 + 2\sec^2 x) dx$$

$$\Rightarrow \int e^y dy = \int (10 + 2\sec^2 x) dx$$

$$\Rightarrow e^y = 10x + 2 \tan x + C$$

$$y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0 \Rightarrow 1 = \frac{5\pi}{2} + 2 + C \Rightarrow C = -1 - \frac{5\pi}{2}$$

$$\Rightarrow e^y = 10x + 2 \tan x - 1 - \frac{5\pi}{2}$$

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0, y(6) = 4$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int -\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + C$$

$$y(6) = 4 \Rightarrow \ln 4 = -\ln 6 + C \Rightarrow C = \ln 24$$

$$\Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln 24$$

$$\Rightarrow \ln|y| + \ln|x| = \ln 24$$

$$\Rightarrow \ln|xy| = \ln 24$$

$$\Rightarrow |xy| = 24$$

$$\Rightarrow |y| = \frac{24}{|x|} \Rightarrow y = \frac{24}{x} \text{ or } \Rightarrow y = -\frac{24}{x}$$

$$\Rightarrow y = \frac{24}{x} \quad \left(\text{لأن } y = -\frac{24}{x} \text{ لا تحقق شروط السؤال} \right)$$



الصورة الإحداثية ومقدار المتجه صفحة 20

1	$A(-1,6), B(-1,-2), C(4,-5), D(5,1)$
	$\vec{AB} = \langle 0, -8 \rangle, \vec{AB} = \sqrt{0 + 64} = 8$
2	$\vec{BC} = \langle 5, -3 \rangle, \vec{BC} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$
3	$\vec{CD} = \langle 1, 6 \rangle, \vec{CD} = \sqrt{1 + 36} = \sqrt{37}$
4	$\vec{DA} = \langle -6, 5 \rangle, \vec{DA} = \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61}$

جمع المتجهات وطرحها وضربها في عدد حقيقي هندسيًا صفحة 20

5	
6	
7	



8	
	جمع المتجهات المكتوبة بالصورة الإحداثية، وطرحها، وضربها في عدد حقيقي صفحة 21
9	$\vec{u} + \vec{v} = \langle 9, 7 \rangle$
10	$\vec{v} - \vec{u} = \langle 3, 11 \rangle$
11	$3\vec{u} + 2\vec{v} = \langle 21, 12 \rangle$
12	$-2\vec{u} + \vec{v} = \langle 0, 13 \rangle$
	الضرب القياسي، والزوايا بين متجهين صفحة 22
13	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2(3) - 5(-1) = 11$
14	$\vec{m} \cdot \vec{n} = -3(8) - 4(6) = -48$
15	$\vec{r} \cdot \vec{s} = -5(2) + 4(3) = 2$
16	$\vec{q} \cdot \vec{p} = 11(-4) + 8(-5) = -84$
	$ \vec{a} = \sqrt{9 + 49} = \sqrt{58}$
	$ \vec{b} = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}$
17	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3(5) + 7(1) = 22$
	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} } \right) = \cos^{-1} \left(\frac{22}{\sqrt{58} \sqrt{26}} \right) \approx 55.5^\circ$



National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development
18	$ \vec{c} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ $ \vec{d} = \sqrt{36 + 81} = \sqrt{117}$ $\vec{c} \cdot \vec{d} = 2(-6) - 3(9) = -39$ $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{c} \cdot \vec{d}}{ \vec{c} \vec{d} } \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-39}{\sqrt{13} \sqrt{117}} \right) = \cos^{-1}(-1) = 180^\circ$ ملحوظة: يمكن ملاحظة أن $\vec{d} = -3\vec{c}$ ، ومنه استنتاج أن قياس الزاوية بينهما هو 180° لأن لهما اتجاهان متعاكسان.	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development
19	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 4(3n - 4) + n(-10) = 0$ $\Rightarrow 12n - 16 - 10n = 0 \Rightarrow n = 8$	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development	National Center for Curriculum Development




الدرس الأول: المتجهات في الفضاء

1



2



3



4



5

$A(3,0,6)$



6

$C(0,5,6)$



7	$D(0,0,6)$
8	$F(3,5,0)$
9	مركزه هو منتصف $\overline{OB}$ وهو: $\left(\frac{0+3}{2}, \frac{0+5}{2}, \frac{0+6}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, 3\right)$
10	$\overrightarrow{AB} = \langle 6, 4, -3 \rangle, \overrightarrow{AB} = \sqrt{36 + 16 + 9} = \sqrt{61}$
11	$\overrightarrow{EF} = \langle 3, 4, -12 \rangle, \overrightarrow{EF} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$
12	$\overrightarrow{GH} = \langle 12, 4, 6 \rangle, \overrightarrow{GH} = \sqrt{144 + 16 + 36} = \sqrt{196} = 14$
13	$ \overrightarrow{AC} = \sqrt{64 + 25 + 45} = \sqrt{134}$ ليكن $\hat{u}$ متجه وحدة في اتجاه $\overrightarrow{AC}$ ، فإن: $\hat{u} = \frac{1}{ \overrightarrow{AC} } \overrightarrow{AC} = \frac{1}{\sqrt{134}} (8\hat{i} + 5\hat{j} - 3\sqrt{5}\hat{k}) = \frac{8}{\sqrt{134}}\hat{i} + \frac{5}{\sqrt{134}}\hat{j} - \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{134}}\hat{k}$
14	$ \vec{v} = \sqrt{25 + 16 + 400} = \sqrt{441} = 21$ $\Rightarrow \hat{v} = \frac{1}{21} \langle -5, 4, 20 \rangle = \langle \frac{-5}{21}, \frac{4}{21}, \frac{6}{21} \rangle$ $\hat{v}$ هو متجه وحدة في اتجاه $\vec{v}$
15	$ \vec{v} = \sqrt{16 + 144 + 9} = 13$ $\Rightarrow \hat{v} = \frac{4}{13}\hat{i} - \frac{12}{13}\hat{j} + \frac{3}{13}\hat{k}$ $\hat{v}$ هو متجه وحدة في اتجاه $\vec{v}$ ، إذن، المتجه الذي له اتجاه $\vec{v}$ نفسه ومقداره 52 هو $52\hat{v}$ ويساوي: $52 \left(\frac{4}{13}\hat{i} - \frac{12}{13}\hat{j} + \frac{3}{13}\hat{k} \right) = 16\hat{i} - 48\hat{j} + 12\hat{k}$
16	$2\vec{u} + 4\vec{v} = 2\langle 3, 5, -7 \rangle + 4\langle -4, 3, -6 \rangle = \langle -10, 22, -38 \rangle$
17	$3\vec{u} - 2\vec{v} = 3\langle 3, 5, -7 \rangle - 2\langle -4, 3, -6 \rangle = \langle 17, 9, -9 \rangle$
18	$a\langle 3, 5, -7 \rangle + 5\langle -4, 3, -6 \rangle = \langle 3a - 20, 5a + 15, -7a - 30 \rangle$ $\Rightarrow \langle 3a - 20, 5a + 15, -7a - 30 \rangle = \langle -2, b, c \rangle$ $\Rightarrow 3a - 20 = -2 \quad \text{و} \quad 5a + 15 = b \quad \text{و} \quad -7a - 30 = c$ $\Rightarrow a = 6 \quad \text{و} \quad b = 45 \quad \text{و} \quad c = -72$



19	$\frac{AP}{PB} = \frac{5}{3} \Rightarrow \frac{BP}{BA} = \frac{3}{8}$ $\vec{OP} = \vec{OB} + \vec{BP} = 2\vec{b} + \frac{3}{8}\vec{BA} = 2\vec{b} + \frac{3}{8}(\vec{BO} + \vec{OA}) = 2\vec{b} + \frac{3}{8}(-2\vec{b} + 2\vec{a})$ $= \left(2 - \frac{3}{4}\right)\vec{b} + \frac{3}{4}\vec{a} = \frac{5}{4}\vec{b} + \frac{3}{4}\vec{a}$ $\vec{OP} = \frac{1}{4}(5\vec{b} + 3\vec{a}) \Rightarrow k = \frac{1}{4}$
20	ليكن متجه الموقع للنقطة N هو $\vec{ON}$ $\vec{LN} = \frac{1}{2}\vec{NM} \Rightarrow \vec{LN} = \frac{1}{3}\vec{LM}$ $\Rightarrow \vec{ON} = \vec{OL} + \vec{LN}$ $= \vec{OL} + \frac{1}{3}\vec{LM} = \vec{OL} + \frac{1}{3}(\vec{OM} - \vec{OL})$ $= \langle -3, 4, -5 \rangle + \frac{1}{3}\langle 3, -6, 9 \rangle$ $= \langle -2, 2, -2 \rangle$ 
21	$\vec{AD} + \vec{DC} = \vec{AC}$ $\Rightarrow \vec{b} + \vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k} \dots \dots \dots (1)$ $\vec{BA} + \vec{AD} = \vec{BD}$ $\Rightarrow -\vec{a} + \vec{b} = -6\hat{i} + 7\hat{j} + 2\hat{k} \dots \dots \dots (2)$ $(1) + (2): 2\vec{b} = -4\hat{i} + 10\hat{j} + 6\hat{k}$ $\Rightarrow \vec{b} = -2\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}$ $(1) - (2): 2\vec{a} = 8\hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k} \Rightarrow \vec{a} = 4\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ 



	$p\vec{a} + q\vec{b} + r\vec{c} = p\langle 1,0,4 \rangle + q\langle 2,0,-3 \rangle + r\langle -5,3,1 \rangle$ $= \langle p + 2q - 5r, 3r, 4p - 3q + r \rangle = \langle 28, -12, -5 \rangle$
22	$3r = -12 \Rightarrow r = -4$ $p + 2q - 5r = 28 \Rightarrow p + 2q = 8 \dots\dots\dots (1)$ $4p - 3q + r = -5 \Rightarrow 4p - 3q = -1 \dots\dots\dots (2)$ $(1) \times 4 - (2): 11q = 33 \Rightarrow q = 3, p = 2$
23	$\vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = 6\vec{a} + 6\vec{c}$
24	$\vec{AC} = \vec{AO} + \vec{OC} = -6\vec{a} + 6\vec{c}$
25	$\vec{OU} = \vec{OA} + \vec{AU} = 6\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{AB} = 6\vec{a} + \frac{2}{3}(6\vec{c}) = 6\vec{a} + 4\vec{c}$
26	$\vec{UT} = \vec{UB} + \vec{BT} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{BC} = \frac{1}{3}(6\vec{c}) + \frac{1}{2}(-6\vec{a}) = 2\vec{c} - 3\vec{a}$
27	$\vec{TA} = \vec{TB} + \vec{BA} = \frac{1}{2}\vec{CB} - 6\vec{c} = \frac{1}{2}(6\vec{a}) - 6\vec{c} = 3\vec{a} - 6\vec{c}$
28	$\vec{OS} = \vec{OC} + \vec{CS} = 6\vec{c} + \frac{3}{5}\vec{CA} = 6\vec{c} + \frac{3}{5}(6\vec{a} - 6\vec{c}) = \frac{18}{5}\vec{a} + \frac{12}{5}\vec{c}$
29	$\vec{US} = \vec{UA} + \vec{AS} = \frac{2}{3}(-6\vec{c}) + \frac{2}{5}(-6\vec{a} + 6\vec{c}) = -\frac{12}{5}\vec{a} - \frac{8}{5}\vec{c}$
30	$\vec{SB} = \vec{SC} + \vec{CB} = \frac{3}{5}\vec{AC} + \vec{CB} = \frac{3}{5}(-6\vec{a} + 6\vec{c}) + 6\vec{a} = \frac{12}{5}\vec{a} + \frac{18}{5}\vec{c}$
31	$\vec{OR} = \vec{OA} + \vec{AR} = \vec{OA} + h\vec{AB}$ $= \vec{OA} + h(\vec{AO} + \vec{OB})$ $= \vec{a} + h(-\vec{a} + \vec{b})$ $= \vec{a} - h\vec{a} + h\vec{b}$ $= (1-h)\vec{a} + h\vec{b}$



$$\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR} = \overrightarrow{OP} + k\overrightarrow{PQ}$$

$$= \overrightarrow{OP} + k(\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ})$$

$$= \overrightarrow{OP} + k(\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BQ})$$

$$= \overrightarrow{OP} + k(\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{OB})$$

$$= \frac{3}{5}\vec{a} + k\left(-\frac{3}{5}\vec{a} + 3\vec{b}\right)$$

$$= \frac{3}{5}\vec{a} - \frac{3}{5}k\vec{a} + 3k\vec{b}$$

$$= \frac{3}{5}(1 - k)\vec{a} + 3k\vec{b}$$

32

في السؤالين السابقين وجدنا أن:

$$\overrightarrow{OR} = (1 - h)\vec{a} + h\vec{b}$$

$$\overrightarrow{OR} = \frac{3}{5}(1 - k)\vec{a} + 3k\vec{b}$$

$$\Rightarrow (1 - h)\vec{a} + h\vec{b} = \frac{3}{5}(1 - k)\vec{a} + 3k\vec{b}$$

33

$$\Rightarrow 1 - h = \frac{3}{5}(1 - k), \quad h = 3k$$

$$\Rightarrow 1 - 3k = \frac{3}{5}(1 - k)$$

$$5 - 15k = 3 - 3k \Rightarrow 2 = 12k$$

$$\Rightarrow k = \frac{1}{6}, \quad h = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\overrightarrow{PR} = k\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{6}\overrightarrow{PQ}$$

34

$$\frac{\overrightarrow{PR}}{\overrightarrow{PQ}} = \frac{1}{6} \Rightarrow \overrightarrow{PR} : \overrightarrow{PQ} = 1 : 6$$



1	$\vec{AB} = \langle -7, 2, 7 \rangle$ $\vec{BC} = \langle -2, 5, -3 \rangle$ $\vec{CD} = \langle 14, -4, -14 \rangle$ $\vec{DA} = \langle -5, -3, 10 \rangle$ بما أن: $\vec{CD} = -2\vec{AB}$ إذن: $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$ لكن لا يوجد عدد حقيقي k حيث $\vec{BC} = k\vec{DA}$ نظرًا لأن النسبة بين الإحداثيات المتناظرة غير متساوية، لذلك $\vec{BC} \nparallel \vec{DA}$ والشكل $ABCD$ ليس متوازي أضلاع.
2	$\vec{AB} = \langle -6, -3, -2 \rangle$ $\vec{BC} = \langle -14, -1, 23 \rangle$ $\vec{CD} = \langle 6, 3, 2 \rangle$ $\vec{DA} = \langle 14, 1, -23 \rangle$ $\vec{AB} = (-1)\vec{CD} \Rightarrow \vec{AB} \parallel \vec{CD}$ $\vec{BC} = (-1)\vec{DA} \Rightarrow \vec{BC} \parallel \vec{DA}$ إذن، الشكل الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع لأن فيه زوجين من الأضلاع المتوازية. يمكن الحل بالاستناد للتوازي:
3	$ABCD \Rightarrow \vec{AB} = \vec{DC} \Rightarrow \vec{OB} - \vec{OA} = \vec{OC} - \vec{OD}$ $\Rightarrow \vec{OD} = \vec{OC} + \vec{OA} - \vec{OB}$ $= \langle 3, 1, 5 \rangle + \langle 2, 3, 1 \rangle - \langle 6, 5, 4 \rangle = \langle -1, -1, 2 \rangle$ $\Rightarrow D(-1, -1, 2)$
4	$\vec{OT} = \vec{OB} + \vec{BT} = 2\vec{b} + \frac{1}{6}\vec{BA} = 2\vec{b} + \frac{1}{6}(\vec{BO} + \vec{OA}) = 2\vec{b} + \frac{1}{6}(-2\vec{b} + 5\vec{a})$ $= \left(2 - \frac{2}{6}\right)\vec{b} + \frac{5}{6}\vec{a} = \frac{10}{6}\vec{b} + \frac{5}{6}\vec{a} = \frac{5}{6}(2\vec{b} + \vec{a})$ $\Rightarrow \vec{OT} = \frac{5}{6}(2\vec{b} + \vec{a})$ $\Rightarrow \vec{OT} \parallel (2\vec{b} + \vec{a})$
5	$\vec{OS} = 3\vec{OR} = 3(\vec{OP} + \vec{PR}) = 3\left(\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{PQ}\right)$ $= 3\vec{a} + \vec{PO} + \vec{OQ}$ $= 3\vec{a} - \vec{a} + \vec{b}$ $= 2\vec{a} + \vec{b}$



6	$\vec{PT} = \vec{PO} + \vec{OT} = -\vec{a} - \vec{b}$ $\vec{PS} = \vec{PO} + \vec{OS} = -\vec{a} + (2\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} + \vec{b}$ $\Rightarrow \vec{PT} = (-1)\vec{PS}$ إذن، المتجهان ينطلقان من النقطة P نفسها ومتوازيان. ومنه، فإن النقاط T, P, S تقع على استقامة واحدة.
7	$\vec{OP} = \vec{OA} + \vec{AP} = 8\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{AC} = 8\vec{a} + \frac{2}{5}(\vec{AO} + \vec{OC}) = 8\vec{a} + \frac{2}{5}(-8\vec{a} + 7\vec{c})$ $= \left(8 - \frac{16}{5}\right)\vec{a} + \frac{14}{5}\vec{c} = \frac{24}{5}\vec{a} + \frac{14}{5}\vec{c} = \frac{2}{5}(12\vec{a} + 7\vec{c})$
8	$\vec{OB} = \vec{OC} + \vec{CB} = 7\vec{c} + 12\vec{a}$ $\Rightarrow \vec{OP} = \frac{2}{5}(12\vec{a} + 7\vec{c}) = \frac{2}{5}\vec{OB} \Rightarrow \vec{OP} \parallel \vec{OB}$ إذن، المتجهان ينطلقان من النقطة نفسها ومتوازيان. ومنه، فإن النقاط O, P, B تقع على استقامة واحدة.
	وجدنا في السؤال السابق أن: $\vec{OP} = \frac{2}{5}\vec{OB}$
9	$\frac{\vec{OP}}{\vec{OB}} = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{OP}{OB} = \frac{2}{5} \Rightarrow \frac{OP}{OP + PB} = \frac{2}{5}$ $\Rightarrow 5 OP = 2 OP + 2 PB \Rightarrow 3 OP = 2 PB$ $\Rightarrow \frac{OP}{PB} = \frac{2}{3} \Rightarrow OP:PB = 2:3$
10	$\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k} + t(4\hat{j} - 2\hat{k}) = 2\hat{i} + (3 + 4t)\hat{j} - (5 + 2t)\hat{k}$
11	$\vec{r} = \langle 2, -7, 11 \rangle + t\langle -4, 5, 8 \rangle = \langle 2 - 4t, -7 + 5t, 11 + 8t \rangle$
12	$\vec{v} = \langle 6 - 1, 19 - (-7) \rangle = \langle 5, 26 \rangle$ $\vec{v}$ هو اتجاه المستقيم المطلوب معادلته، $\Rightarrow \vec{r} = \langle 1, -7 \rangle + t\langle 5, 26 \rangle = \langle 1 + 5t, -7 + 26t \rangle$
13	$\vec{v} = \langle 7 - (-5), 13 - 4, -8 - 15 \rangle = \langle 12, 9, -23 \rangle$ $\vec{v}$ هو اتجاه المستقيم المطلوب معادلته، $\Rightarrow \vec{r} = \langle -5, 4, 15 \rangle + t\langle 12, 9, -23 \rangle = \langle -5 + 12t, 4 + 9t, 15 - 23t \rangle$



14	$\vec{v} = \langle 13 - 5, 10 - 22, 3 - (-8) \rangle = \langle 8, -12, 11 \rangle$ $\vec{v}$ هو اتجاه المستقيم المطلوب معادلته، $\Rightarrow \vec{r} = \langle 5, 22, -8 \rangle + t \langle 8, -12, 11 \rangle = \langle 5 + 8t, 22 - 12t, -8 + 11t \rangle$
15	$\vec{v} = \langle 9 - 0, 4 - 2, 6 - (-5) \rangle = \langle 9, 2, 11 \rangle$ $\vec{v}$ هو اتجاه المستقيم المطلوب معادلته، $\Rightarrow \vec{r} = \langle 0, 2, -5 \rangle + t \langle 9, 2, 11 \rangle = \langle 9t, 2 + 2t, -5 + 11t \rangle$
16	تقع النقطة $(3, 7, 11)$ على المستقيم l إذا وُجد عدد حقيقي t حيث: $\langle -5 + 3t, 8 - 2t, 4 + 9t \rangle = \langle 3, 7, 11 \rangle$ $\Rightarrow -5 + 3t = 3 \quad \text{و} \quad 8 - 2t = 7 \quad \text{و} \quad 4 + 9t = 11$ $\Rightarrow t = \frac{8}{3}, \quad t = \frac{1}{2}, \quad t = \frac{7}{9}$ لا توجد قيمة واحدة للوسيط t تحقق المعادلات الثلاث، إذن: النقطة $(3, 7, 11)$ لا تقع على المستقيم l. تقع النقطة $(1, b, c)$ على المستقيم l، إذن توجد قيمة للوسيط t تحقق المعادلة الآتية:
17	$\langle -5 + 3t, 8 - 2t, 4 + 9t \rangle = \langle 1, b, c \rangle$ $-5 + 3t = 1 \Rightarrow t = 2$ $8 - 2t = b \Rightarrow 8 - 4 = b \Rightarrow b = 4$ $4 + 9t = c \Rightarrow 4 + 18 = c \Rightarrow c = 22$
18	الإحداثي y للنقطة الواقعة في المستوى xz هو 0 نجد قيمة t التي تحقق المعادلة $8 - 2t = 0$، وهي $t = 4$ ولإيجاد نقطة تقاطع المستقيم l مع المستوى xz نعوض $t = 4$ في معادلته: $\vec{r} = \langle -5 + 3t, 8 - 2t, 4 + 9t \rangle \Rightarrow \vec{r} = \langle -5 + 12, 8 - 8, 4 + 36 \rangle = \langle 7, 0, 40 \rangle$ إذن، إحداثيات نقطة تقاطع المستقيم l مع المستوى xz هي: $(7, 0, 40)$ يتوازي المستقيمان إذا توازى اتجاهاهما، أي:
19	$\langle 4, a, -12 \rangle \parallel \langle 3, -2, -9 \rangle$ $\Rightarrow \langle 4, a, -12 \rangle = k \langle 3, -2, -9 \rangle, k \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow 4 = 3k \Rightarrow k = \frac{4}{3}$ $\Rightarrow a = -2k = \frac{4}{3}(-2) = -\frac{8}{3}$



	النقاط $A(7,1,q), V(2,5,-3), U(p,-3,-1)$ على استقامة واحدة:
20	$\Rightarrow \overrightarrow{AV} \parallel \overrightarrow{VU} \Rightarrow \overrightarrow{AV} = k\overrightarrow{VU}, k \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow \langle -5, 4, -3 - q \rangle = k\langle p - 2, -8, 2 \rangle$ $4 = -8k \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$ $-5 = k(p - 2) \Rightarrow p = 12$
21	$\overrightarrow{VU} = \langle 12 - 2, -3 - 5, -1 - (-3) \rangle = \langle 10, -8, 2 \rangle$ اتجاه المستقيم l هو: $\vec{v} = \langle 10, -8, 2 \rangle$ ، ويمكن تبسيطه إلى $\langle 5, -4, 1 \rangle$ معادلة المستقيم l هي: $\vec{r} = \langle 2, 5, -3 \rangle + t\langle 5, 4, 1 \rangle$
22	من السؤال 20 نجد أن:
	$-3 - q = 2k \Rightarrow -3 - q = -1 \Rightarrow q = -2$
	لإيجاد متجه موقع النقطة D نعوض $\lambda = 2$ في معادلة l_1
23	$\vec{r} = \langle 3 + 2, -2 + 2(2), 4 - 2 \rangle = \langle 5, 2, 2 \rangle$ $\overrightarrow{AB} = \langle 3, 2, -1 \rangle$ إذن، معادلة المستقيم المطلوب هي:
	$\vec{r} = \langle 5, 2, 2 \rangle + t\langle 3, 2, -1 \rangle$



	اتجاه l_1: $\langle 1, -1, -2 \rangle$ معادلة l_1: $\vec{r} = \langle 4, 3, 3 \rangle + t\langle 1, -1, -2 \rangle$ اتجاه l_2: $\langle -1, 0, 1 \rangle$ معادلة l_2: $\vec{r} = \langle 5, 1, 0 \rangle + u\langle -1, 0, 1 \rangle$ المستقيمان غير متوازيين لعدم وجود عدد حقيقي k يحقق المعادلة: $\langle 1, -1, -2 \rangle = k\langle -1, 0, 1 \rangle$ يتقاطع المستقيمان إذا وجد عدداً حقيقيين t, u يحققان: $\langle 4 + t, 3 - t, 3 - 2t \rangle = \langle 5 - u, 1, u \rangle$ 24 $\Rightarrow 3 - t = 1 \Rightarrow t = 2$ $\Rightarrow 4 + t = 5 - u \Rightarrow t + u = 1 \Rightarrow 2 + u = 1 \Rightarrow u = -1$ $\Rightarrow 3 - 2t = u \Rightarrow 2t + u = 3$ $2(2) + (-1) \stackrel{?}{=} 3$ $3 = 3 \checkmark$ تحققت المعادلات الثلاث للقيمتين $t = 2, u = -1$، فالمستقيمان متقاطعان، ونجد نقطة تقاطعهما بتعويض $t = 2$ في معادلة l_1 $\vec{r} = \langle 4, 3, 3 \rangle + 2\langle 1, -1, -2 \rangle = \langle 6, 1, -1 \rangle$ إذن، نقطة التقاطع هي: $(6, 1, -1)$
25	اتجاه l_1: $\langle 2, 2, 3 \rangle$ معادلة l_1: $\vec{r} = \langle 3, 1, -2 \rangle + t\langle 2, 2, 3 \rangle$ اتجاه l_2: $\langle 2, 1, -1 \rangle$ معادلة l_2: $\vec{r} = \langle 9, 6, -2 \rangle + u\langle 2, 1, -1 \rangle$ المستقيمان غير متوازيين لعدم وجود عدد حقيقي k يحقق المعادلة: يتقاطع المستقيمان إذا وجد عدداً حقيقيين t, u بحيث: $\langle 3 + 2t, 1 + 2t, -2 + 3t \rangle = \langle 9 + 2u, 6 + u, -2 - u \rangle$ (1) $\Rightarrow 3 + 2t = 9 + 2u \Rightarrow t - u = 3$ (2) $1 + 2t = 6 + u \Rightarrow 2t - u = 5$ (3) $-2 + 3t = -2 - u \Rightarrow 3t + u = 0$ (2) - (1): $t = 2 \Rightarrow u = -1$ نفحص تحقق المعادلة (3) عند $t = 2, u = -1$: $3(2) + (-1) \stackrel{?}{=} 0$ $5 = 0 \times$ عبارة غير صحيحة المعادلة غير متحققة، إذن، المستقيمان غير متقاطعين، و غير متوازيين، فهما متخالفان.



$$\overrightarrow{AB} = \langle 3, -3, -2 \rangle$$

$$\vec{r} = \langle 2, 1, 3 \rangle + t \langle 3, -3, -2 \rangle \quad \text{معادلة المستقيم:}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{OC} = \langle 2 + 3t, 1 - 3t, 3 - 2t \rangle$$

$$AC = 3CB \Rightarrow |\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}| = 3|\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}|$$

$$\Rightarrow \sqrt{(2 + 3t - 2)^2 + (1 - 3t - 1)^2 + (3 - 2t - 3)^2}$$

$$= 3\sqrt{(2 + 3t - 5)^2 + (1 - 3t + 2)^2 + (3 - 2t - 1)^2}$$

$$\Rightarrow 8t^2 - 18t + 9 = 0$$

(بتربيع الطرفين وفك الأقواس)

$$\Rightarrow (2t - 3)(4t - 3) = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{3}{2} \Rightarrow C \left(\frac{13}{2}, -\frac{7}{2}, 0 \right)$$

$$\text{أو } t = \frac{3}{4} \Rightarrow C \left(\frac{17}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{3}{2} \right)$$

حل آخر:

هناك حالتان لمواضع النقاط A, B, C:

الأولى: أن تكون C بين A، و B كما في الرسم الآتي:



26

وفي هذه الحالة يكون متجه موقع النقطة C هو: متجه موقع A زائداً $\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$ أي:

$$\vec{r} = \langle 2, 1, 3 \rangle + \frac{3}{4} \langle 3, -3, -2 \rangle = \left\langle \frac{17}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{3}{2} \right\rangle$$

والثانية: أن تكون C خارج القطعة المستقيمة $\overrightarrow{AB}$ ، كما في الرسم

المجاور، وفي هذه الحالة يكون متجه موقع النقطة C هو:

متجه موقع A زائداً $\frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$ أي:

$$\vec{r} = \langle 2, 1, 3 \rangle + \frac{3}{2} \langle 3, -3, -2 \rangle = \left\langle \frac{13}{2}, -\frac{7}{2}, 0 \right\rangle$$

إذن، الإحداثيات الممكنة للنقطة C هي: $\left(\frac{17}{4}, -\frac{5}{4}, \frac{3}{2} \right)$ و $\left(\frac{13}{2}, -\frac{7}{2}, 0 \right)$

الطريقة الثالثة للحل:

بما أن النقاط A, B, C على استقامة واحدة، فهناك حالتان:

إما $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$ أو $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$



نثبت أن كل زوج من أزواج المستقيمات، متقاطعان، ونجد نقاط التقاطع (رؤوس المثلث):
متجه موقع أي نقطة على المستقيمات الثلاثة على التوالي تعطي كما يأتي:

$$\begin{pmatrix} -3 + 5t \\ 1 - 2t \\ 4 - 4t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 + s \\ 5 + s \\ -4 - 2s \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 + 2q \\ -1 - 5q \\ 2q \end{pmatrix}$$

$$\langle -3 + 5t, 1 - 2t, 4 - 4t \rangle = \langle 1 + s, 5 + s, -4 - 2s \rangle \quad \text{أولاً:}$$

$$-3 + 5t = 1 + s \Rightarrow 5t - s = 4 \dots \dots \dots (1)$$

$$1 - 2t = 5 + s \Rightarrow 2t + s = -4 \dots \dots \dots (2)$$

$$4 - 4t = -4 - 2s \Rightarrow 2t - s = 4 \dots \dots \dots (3)$$

$$(1) + (2): 7t = 0 \Rightarrow t = 0, s = -4$$

نفحص تحقق المعادلة (3) عند $t = 0, s = -4$: $\checkmark 2(0) - (-4) = 4$

إذن، يتقاطع المستقيمان، ونقطة تقاطعهما هي: $A(-3, 1, 4)$

$$\langle 1 + s, 5 + s, -4 - 2s \rangle = \langle 2 + 2q, -1 - 5q, 2q \rangle \quad \text{ثانياً:}$$

$$1 + s = 2 + 2q \Rightarrow s - 2q = 1 \dots \dots \dots (1)$$

$$5 + s = -1 - 5q \Rightarrow s + 5q = -6 \dots \dots \dots (2)$$

$$-4 - 2s = 2q \Rightarrow s + q = -2 \dots \dots \dots (3)$$

$$(2) - (1): 7q = -7 \Rightarrow q = -1, s = -1$$

نفحص تحقق المعادلة (3) عند $q = -1, s = -1$: $\checkmark (-1) + (-1) = -2$

إذن، يتقاطع المستقيمان، ونقطة تقاطعهما هي: $B(0, 4, -2)$

$$\langle -3 + 5t, 1 - 2t, 4 - 4t \rangle = \langle 2 + 2q, -1 - 5q, 2q \rangle \quad \text{ثالثاً:}$$

$$-3 + 5t = 2 + 2q \Rightarrow 5t - 2q = 5 \dots \dots \dots (1)$$

$$1 - 2t = -1 - 5q \Rightarrow 2t - 5q = 2 \dots \dots \dots (2)$$

$$4 - 4t = 2q \Rightarrow 2t + q = 2 \dots \dots \dots (3)$$

$$(3) - (2): 6q = 0 \Rightarrow q = 0, t = 1$$

نفحص تحقق المعادلة (1) عند $q = 0, t = 1$: $\checkmark 5(1) - 2(0) = 5$

إذن، يتقاطع المستقيمان، ونقطة تقاطعهما هي: $C(2, -1, 0)$

أثبتنا أن كل اثنين من هذه المستقيمات متقاطعان، فهذه المستقيمات تكون مثلثاً، أطوال أضلاعه هي:

$$AB = \sqrt{9 + 9 + 36} = \sqrt{54}$$

$$BC = \sqrt{4 + 25 + 4} = \sqrt{33}$$

$$AC = \sqrt{25 + 4 + 16} = \sqrt{45}$$



1	$\vec{u} \cdot \vec{v} = 4(-2) + 5(3) - 3(-7) = 28$
2	$\vec{e} \cdot \vec{f} = -13(-2) + 8(3) - 5(10) = 0$
3	$\vec{m} \cdot \vec{n} = 7(2) + 4(-5) - 9(10) = -96$
4	$\vec{w} \cdot \vec{v} = 15(6) + 24(5) - 7(a) = 0 \Rightarrow a = 30$
	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 5(2) + 2(-1) + 3(-2) = 2$
	$ \vec{a} = \sqrt{25 + 4 + 9} = \sqrt{38}$
5	$ \vec{b} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$
	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} } \right) = \cos^{-1} \left(\frac{2}{3\sqrt{38}} \right) \approx 83.8^\circ$
	$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1(-1) + 1(-1) - 1(4) = -6$
	$ \vec{a} = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$
6	$ \vec{b} = \sqrt{1 + 1 + 16} = 3\sqrt{2}$
	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} } \right) = \cos^{-1} \left(\frac{-6}{3\sqrt{6}} \right) = \cos^{-1} \left(-\frac{2}{\sqrt{3}} \right) \approx 144.7^\circ$
7	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \lambda(\lambda) + 4(-3) + \lambda(4) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 4\lambda - 12 = 0$ $\Rightarrow (\lambda + 6)(\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \lambda = -6, \lambda = 2$
	$\vec{v} = \langle 2, -6, 3 \rangle : l_1$ اتجاه $\vec{w} = \langle 3, -4, 12 \rangle : l_2$ اتجاه
8	$\vec{v} \cdot \vec{w} = 2(3) - 6(-4) + 3(12) = 66$
	$ \vec{v} = \sqrt{4 + 36 + 9} = 7$
	$ \vec{w} = \sqrt{9 + 16 + 144} = 13$
	$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{ \vec{v} \vec{w} } \right) = \cos^{-1} \left(\frac{66}{7(13)} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{66}{91} \right) \approx 43.5^\circ$




	$\vec{v} = \langle 3 - (-2), -5 - 11, 9 - 6 \rangle = \langle 5, -16, 3 \rangle : l_1$ اتجاه $\vec{w} = \langle 4 - (-5), 3 - 9, 8 - 12 \rangle = \langle 9, -6, -4 \rangle : l_2$ اتجاه $\vec{v} \cdot \vec{w} = 5(9) - 16(-6) + 3(-4) = 129$
9	$ \vec{v} = \sqrt{25 + 256 + 9} = \sqrt{290}$ $ \vec{w} = \sqrt{81 + 36 + 16} = \sqrt{133}$ $\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{ \vec{v} \vec{w} } \right) = \cos^{-1} \left(\frac{129}{\sqrt{290} \sqrt{133}} \right) \approx 48.9^\circ$
10	$\vec{m} = \langle v, 0, -1 \rangle, \vec{n} = \langle 2, -1, 0 \rangle$ $\vec{m} \cdot \vec{n} = 2v + 0 + 0 = 2v$ $ \vec{m} = \sqrt{v^2 + 1}$ $ \vec{n} = \sqrt{4 + 1 + 0} = \sqrt{5}$ $\vec{m} \cdot \vec{n} = \vec{m} \vec{n} \cos 60^\circ$ $\Rightarrow 2v = \sqrt{5(v^2 + 1)} \times \frac{1}{2} \Rightarrow 16v^2 = 5v^2 + 5 \Rightarrow v^2 = \frac{5}{11} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{5}{11}}$ لأن $\left(-\sqrt{\frac{5}{11}}\right)$ لا يجعل قياس الزاوية بين المتجهين 60°
11	$\vec{OA} = \langle 3, -2, 6 \rangle, \vec{OB} = \langle -5, 4, 1 \rangle$ $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = -5(3) + 4(-2) + 1(6) = -17$ $ \vec{OA} = \sqrt{9 + 4 + 36} = 7$ $ \vec{OB} = \sqrt{25 + 16 + 1} = \sqrt{42}$ $m\angle AOB = \theta$ $\cos \theta = \frac{-17}{7\sqrt{42}} \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{-17}{7\sqrt{42}}\right)^2} = \frac{\sqrt{1776}}{7\sqrt{42}}$ $Area = \frac{1}{2} (OA)(OB) \sin \theta = \frac{1}{2} (7)(\sqrt{42}) \frac{\sqrt{1776}}{7\sqrt{42}} = \frac{1}{2} \sqrt{1776} \approx 21.07$



	$\vec{EF} = \langle 4, -10, -7 \rangle$ $\vec{r} = \langle 1, -3, 5 \rangle + t\langle 4, -10, -7 \rangle$ معادلة المستقيم l هي : إذا كانت M هي مسقط العمود من G على المستقيم l، فإن: $\Rightarrow \vec{OM} = (1 + 4t, -3 - 10t, 5 - 7t)$ $\vec{MG} = (-1 - 4t, -3 + 10t, -1 + 7t)$ ويكون:
12	$\vec{EF} \perp \vec{MG}$ $\Rightarrow \langle 4, -10, -7 \rangle \perp \langle -1 - 4t, -3 + 10t, -1 + 7t \rangle$ $\Rightarrow 4(-1 - 4t) - 10(-3 + 10t) - 7(-1 + 7t) = 0$ $\Rightarrow -4 - 16t + 30 - 100t + 7 - 49t = 0$ $\Rightarrow -165t = -61 \Rightarrow t = \frac{33}{165} = 0.2$ $\Rightarrow M(1.8, -5, 3.6)$
13	$GM = \sqrt{(1.8 - 0)^2 + (-5 + 6)^2 + (3.6 - 4)^2} = \sqrt{4.4} \approx 2.1$
	مساحة متوازي الأضلاع $ABCD$ تساوي مثلي مساحة المثلث BAC لأن القطر AC يقسمه إلى مثلثين متطابقين.
14	$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 6(15) - 2(8) + 11(5) = 129$ $\vec{AB} = \sqrt{36 + 4 + 121} = \sqrt{161}$ $\vec{AC} = \sqrt{225 + 64 + 25} = \sqrt{314}$ $m\angle BAC = \theta = \cos^{-1} \left(\frac{129}{\sqrt{161}\sqrt{314}} \right) \approx 55^\circ$ $Area(ABCD) = 2 \times \frac{1}{2} (AC)(AB) \sin \theta = \sqrt{161}\sqrt{314} \sin 55^\circ \approx 184.2$
15	$\begin{pmatrix} q \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} q \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow -q + 6 - 2 = 0 \Rightarrow q = 4$



16	$\langle -4 + 4u, 10 + 2u, p - u \rangle = \langle 8 - t, 2 + 3t, -12 + 2t \rangle$ $-4 + 4u = 8 - t \Rightarrow 4u + t = 12 \dots \dots \dots (1)$ $10 + 2u = 2 + 3t \Rightarrow 2u - 3t = -8 \dots \dots \dots (2)$ $p - u = -12 + 2t \Rightarrow p = 2t + u - 12 \dots \dots \dots (3)$ $(1) \times 3 + (2): 14u = 28 \Rightarrow u = 2, t = 4$ وبما أن المستقيمين متقاطعان، نتحقق المعادلة (3) أيضًا عند $u = 2, t = 4$ ويكون: $p = -2$ وتكون نقطة تقاطع المستقيمين هي $M(4, 14, -4)$
17	العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر فيها ينصفه (نظرية)، والنقطة M (نقطة تقاطع l_1 و l_2) هي نقطة منتصف الوتر $\overline{AB}$. $\Rightarrow \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{AM}$ $= \langle 9, -1, -14 \rangle + 2(\langle 4, 14, -4 \rangle - \langle 9, -1, -14 \rangle)$ $= \langle 9, -1, -14 \rangle + 2\langle -5, 15, 10 \rangle$ $= \langle -1, 29, 6 \rangle$
18	 $\overrightarrow{OF} = \langle -19 + t, 14 - 3t, -5 + at \rangle$ $\overrightarrow{TF} = \langle -19 + t + 2, 14 - 3t - 5, -5 + at - 8 \rangle$ $= \langle -17 + t, 9 - 3t, -13 + at \rangle$ $\overrightarrow{TF} \perp l \Rightarrow \langle -17 + t, 9 - 3t, -13 + at \rangle \cdot \langle 1, -3, a \rangle = 0$ $\Rightarrow -17 + t - 3(9 - 3t) + a(-13 + at) = 0$ $\Rightarrow -17 + t - 27 + 9t - 13a + a^2t = 0$ $\Rightarrow (10 + a^2)t = 13a + 44$ $\Rightarrow t = \frac{13a + 44}{10 + a^2}$



	$\frac{13a + 44}{10 + a^2} = 5 \Rightarrow 5a^2 + 50 = 13a + 44$ $\Rightarrow 5a^2 - 13a + 6 = 0 \Rightarrow (5a - 3)(a - 2) = 0 \Rightarrow a = \frac{3}{5}, a = 2$
19	$\vec{OF} = \langle -19 + t, 14 - 3t, -5 + at \rangle$ $a = 2 \Rightarrow \vec{OF} = \langle -19 + 5, 14 - 15, -5 + 10 \rangle = \langle -14, -1, 5 \rangle$ $a = \frac{3}{5} \Rightarrow \vec{OF} = \langle -19 + 5, 14 - 15, -5 + 3 \rangle = \langle -14, -1, -2 \rangle$
20	متجه الموقع لأي نقطة على المستقيم l هو: $\langle 3 + 7u, -2 - 7u, 4 + 5u \rangle$ تقع C على المستقيم l إذا وجد عدد حقيقي u حيث: $\langle 3 + 7u, -2 - 7u, 4 + 5u \rangle = \langle -4, 5, -1 \rangle$ $\Rightarrow 3 + 7u = -4, -2 - 7u = 5, 4 + 5u = -1$ $\Rightarrow u = -1, u = -1, u = -1$ إذن، C تقع على المستقيم l المعطى لأنها تنتج من تعويض $u = -1$ في معادلته المتجهة.
21	$\vec{AB} = \langle 1 - 3, -5 - (-2), 6 - 4 \rangle = \langle -2, -3, 2 \rangle$ $\Rightarrow \vec{r} = \langle 3, -2, 4 \rangle + t\langle -2, -3, 2 \rangle$ هي معادلة متجهة للمستقيم المطلوب.
22	$\vec{OD} = \langle 3 - 2t, -2 - 3t, 4 + 2t \rangle$ $\vec{CD} = \langle 3 - 2t + 4, -2 - 3t - 5, 4 + 2t + 1 \rangle = \langle 7 - 2t, -7 - 3t, 5 + 2t \rangle$ $\angle CDA$ قائمة، فإن $\vec{CD} \perp \vec{AD}$ وهذا يعني أن $\vec{CD}$ يعامد $\vec{AB}$ لأن D تقع على $\vec{AB}$. $\Rightarrow \vec{AB} \perp \vec{CD} \Rightarrow \langle -2, -3, 2 \rangle \cdot \langle 7 - 2t, -7 - 3t, 5 + 2t \rangle = 0$ $\Rightarrow -2(7 - 2t) - 3(-7 - 3t) + 2(5 + 2t) = 0$ $\Rightarrow -14 + 4t + 21 + 9t + 10 + 4t = 0$ $\Rightarrow 17t = -17 \Rightarrow t = -1$ $\vec{OD} = \langle 3 + 2, -2 + 3, 4 - 2 \rangle = \langle 5, 1, 2 \rangle$ $\Rightarrow D(5, 1, 2)$
23	اتجاه المستقيم الأول l_1: $\langle 2, -1, -2 \rangle$ اتجاه المستقيم الثاني l_2: $\langle 1, -2, 2 \rangle$ المستقيمان متعامدان لأن: $\langle 2, -1, -2 \rangle \cdot \langle 1, -2, 2 \rangle = 2(1) - 1(-2) - 2(2) = 0$



يتقاطع المستقيمان إذا وجدت قيم حقيقية t, u تحقق:

$$\langle 8 + 2t, 2 - t, -2t \rangle = \langle -9 + u, 21 - 2u, -4 + 2u \rangle$$

$$8 + 2t = -9 + u \Rightarrow 2t - u = -17 \dots \dots \dots (1)$$

$$2 - t = 21 - 2u \Rightarrow 2u - t = 19 \dots \dots \dots (2)$$

$$-2t = -4 + 2u \Rightarrow 2t + 2u = 4 \dots \dots \dots (3)$$

$$24 \quad (3) - (1): 3u = 21 \Rightarrow u = 7, \quad t = -5$$

نفحص تحقق المعادلة (2) عند هذه القيم: $\checkmark 2(7) - (-5) = 19$

إذن، يتقاطع المستقيمان، ونجد نقطة التقاطع بتعويض $u = 7$ في معادلة l_2 :

$$\vec{r} = \langle -9 + 7, 21 - 14, -4 + 14 \rangle = \langle -2, 7, 10 \rangle$$

إذن، نقطة التقاطع هي: $E(-2, 7, 10)$



إيجاد التوافيق صفحة 31

1	$\binom{10}{3} = \frac{10!}{7!3!} = 120$
2	$\binom{50}{1} = \frac{50!}{1!49!} = 50$
3	$\binom{100}{99} = \frac{100!}{99!1!} = 100$
4	$\binom{1000}{0} = \frac{1000!}{0!1000!} = 1$
5	$\binom{20}{20} = \frac{20!}{20!0!} = 1$
إيجاد التباديل صفحة 31	
6	$P(10,9) = \frac{10!}{1!} = 10! = 3628800$
7	$P(8,0) = \frac{8!}{8!} = 1$
8	$P(7,7) = \frac{7!}{0!} = 7! = 5040$
9	$P(6,1) = \frac{6!}{5!} = \frac{6(5!)}{5!} = 6$
10	$P(5,2) = \frac{5!}{3!} = \frac{5(4)3!}{3!} = 20$



المتغيرات العشوائية، وتوزيعها الاحتمالي صفحة 32

$$X \in \{0,1,2,3,4\}$$

$$P(X = 0) = P(TTTT) = \frac{1}{16}$$

$$P(X = 1) = P(\{HTTT, THTT, TTHT, TTTH\}) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 2) = P(\{TTHH, THHT, HTHT, HTTH, THTH, HHTT\}) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3) = P(\{THHH, HHHT, HTHH, HHTH\}) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$P(X = 4) = P(HHHH) = \frac{1}{16}$$

X	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$

$$X \in \{1,2,3\}$$

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{4}{4}}{\binom{7}{5}} = \frac{1}{7}, P(X = 2) = \frac{\binom{3}{2}\binom{4}{3}}{\binom{7}{5}} = \frac{4}{7}, P(X = 3) = \frac{\binom{3}{3}\binom{4}{2}}{\binom{7}{5}} = \frac{2}{7}$$

X	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$



$$X \in \{0,1,2,3,4,5\}$$

$$P(X = 0) = P(\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 1) = P(\{(1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3), (4,5), (5,4), (5,6), (6,5)\}) \\ = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

$$P(X = 2) = P(\{(1,3), (2,4), (3,5), (4,6), (3,1), (4,2), (5,3), (6,4)\}) \\ = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

$$P(X = 3) = P(\{(1,4), (2,5), (3,6), (4,1), (5,2), (6,3)\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 4) = P(\{(1,5), (2,6), (5,1), (6,2)\}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

$$P(X = 5) = P(\{(1,6), (6,1)\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

X	0	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$

إيجاد الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والتباين لمجموعة من المشاهدات صفحة 33

$$\mu = \frac{1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 - 1 - 5 + 3}{10} = 1.4$$

$$\sum_{i=1}^{14} x_i^2 = 92$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2}{n} - (\mu)^2 = \frac{92}{10} - 1.96 = 7.24$$

$$\sigma = \sqrt{7.24} \approx 2.7$$

$$\mu = \frac{-2 - 3 - 4 + 5 + 2 + 1 + 4 + 5}{8} = 1$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n} = \frac{9 + 16 + 25 + 16 + 1 + 0 + 9 + 16}{8} = 11.5$$

$$\sigma = \sqrt{11.5} \approx 3.4$$



إيجاد التوقع، والتباين، والانحراف المعياري صفحة 34

$$E(x) = \sum xp(x) = -0.2$$

$$\sigma^2 = \sum x^2p(x) - (E(x))^2 = 1(0.4) + 1(0.6) - (-0.2)^2 = 0.96$$

$$\sigma = \sqrt{0.96} \approx 0.98$$

$$\sum p(x) = 1 \Rightarrow 0.2 + 0.1 + 0.3 + k = 1 \Rightarrow k = 0.4$$

$$E(x) = \sum xp(x) = 1.9$$

$$\sigma^2 = \sum x^2p(x) - (E(x))^2 = 1(0.1) + 4(0.3) + 9(0.4) - (1.9)^2 = 1.29$$

$$\sigma = \sqrt{1.29} \approx 1.14$$



الدرس الأول: التوزيع الهندسي وتوزيع ذي الحدين

1	$P(X = 4) = \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^3 = \frac{343}{4096} \approx 0.084$
2	$P(X \leq 4) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$ $= \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^0 + \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^1 + \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^2 + \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^3 = 0.414$
3	$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 1)$ $= 1 - \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^0 = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 0.875$
4	$P(3 \leq X \leq 7)$ $= P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7)$ $= \frac{1}{8} \left(\left(\frac{7}{8}\right)^2 + \left(\frac{7}{8}\right)^3 + \left(\frac{7}{8}\right)^4 + \left(\frac{7}{8}\right)^5 + \left(\frac{7}{8}\right)^6 \right) \approx 0.373$
5	$P(X < 2) = P(X = 1) = \frac{1}{8} = 0.125$
6	$P(X > 5) = \left(1 - \frac{1}{8}\right)^5 = \left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0.513$
7	$P(1 < X < 3) = P(X = 2) = \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^1 = \frac{7}{64} \approx 0.109$
8	$P(4 < X \leq 6) = P(X = 5) + P(X = 6) = \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^4 + \frac{1}{8} \left(\frac{7}{8}\right)^5 \approx 0.137$
9	$P(X = 4) = \binom{5}{4} (0.4)^4 (0.6)^1 \approx 0.077$
10	$P(X \geq 5) = P(X = 5) = \binom{5}{5} (0.4)^5 (0.6)^0 \approx 0.010$
11	$P(X \leq 3) = 1 - (P(X = 4) + P(X = 5))$ $= 1 - \left(\binom{5}{4} (0.4)^4 (0.6)^1 + \binom{5}{5} (0.4)^5 (0.6)^0 \right) \approx 0.913$
12	$P(3 < X \leq 5) = P(X = 4) + P(X = 5)$ $= \binom{5}{4} (0.4)^4 (0.6)^1 + \binom{5}{5} (0.4)^5 (0.6)^0 \approx 0.087$
13	$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$ $= \binom{5}{3} (0.4)^3 (0.6)^2 + \binom{5}{4} (0.4)^4 (0.6)^1 + \binom{5}{5} (0.4)^5 (0.6)^0$ ≈ 0.317



14	$P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)$ $= \binom{5}{0} (0.4)^0 (0.6)^5 + \binom{5}{1} (0.4)^1 (0.6)^4 + \binom{5}{2} (0.4)^2 (0.6)^3$ ≈ 0.683
15	$P(2 \leq X < 5) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$ $= \binom{5}{2} (0.4)^2 (0.6)^3 + \binom{5}{3} (0.4)^3 (0.6)^2 + \binom{5}{4} (0.4)^4 (0.6)^1$ ≈ 0.653
16	$P(5 < X < 8) = 0$
17	$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.45} = \frac{20}{9} \approx 2.22$
18	$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{\frac{2}{5}} = \frac{5}{2} = 2.5$
19	$E(X) = np = 10(0.2) = 2$ $Var(X) = \sigma^2 = np(1-p) = 10(0.2)(0.8) = 1.6$
20	$E(X) = np = 150(0.3) = 45$ $Var(X) = \sigma^2 = np(1-p) = 150(0.3)(0.7) = 31.5$
21	$P(X < 5) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4)$ $= 0.1(0.9)^0 + 0.1(0.9)^1 + 0.1(0.9)^2 + 0.1(0.9)^3 = 0.3439$
22	$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3))$ $= 1 - (0.1 + 0.1(0.9) + 0.1(0.9)^2) = 0.729$ ويمكن حسابه باستعمال القاعدة: $P(X > x) = (1 - p)^x$ $P(X > 3) = (1 - 0.1)^3 = (0.9)^3 = 0.729$
23	ليكن X عدد الاهداف المسجلة في الرميات الـ 15 $\Rightarrow X \sim B(15, 0.1)$ $P(X = 3) = \binom{15}{3} (0.1)^3 (0.9)^{12} \approx 0.129$
24	ليكن X عدد الطلبة الذين سيحتاجون أوراقًا إضافية من بين الطلبة الثلاثين: $\Rightarrow X \sim B\left(30, \frac{3}{5}\right) \Rightarrow P(X = 10) = \binom{30}{10} \left(\frac{3}{5}\right)^{10} \left(\frac{2}{5}\right)^{20} \approx 0.002$
25	$P(X = 0) = \binom{30}{0} \left(\frac{3}{5}\right)^0 \left(\frac{2}{5}\right)^{30} = \left(\frac{2}{5}\right)^{30} \approx 1.153 \times 10^{-12}$



1	$\mu_A = 15 > \mu_B = 12$ $\sigma_B > \sigma_A$ وذلك لأن قيم المتغير العشوائي في B أكثر انتشاراً من نظيراتها في المنحنى A
2	$P(0 < Z < 1.2) = P(Z < 1.2) - P(Z < 0) = 0.8849 - 0.5 = 0.3849$
3	$P(Z > 2) = 1 - P(Z < 2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$
4	$P(Z < z) = 0.638$ الاحتمال المعطى (0.638) يمثل المساحة التي تقع يسار القيمة z وهو أكبر من 0.5، إذن: z موجبة. $\Rightarrow z = 0.35$
5	$P(Z > z) = 0.6$ الاحتمال المعطى (0.6) يمثل المساحة التي تقع يمين القيمة z وهو أكبر من 0.5، إذن: z سالبة. $\Rightarrow P(Z > -z) = 0.6 \Rightarrow P(Z < z) = 0.6 \Rightarrow z = 0.25 \Rightarrow$ إذن، قيمة z التي تحقق الاحتمال المعطى هي $z = -0.25$
6	$P(0 < Z < z) = 0.45$ $\Rightarrow P(Z < z) - P(Z < 0) = 0.45$ $\Rightarrow P(Z < z) - 0.5 = 0.45$ $\Rightarrow P(Z < z) = 0.95$ الاحتمال المعطى (0.95) يمثل المساحة التي تقع يسار القيمة z وهو أكبر من 0.5، إذن: z موجبة. $\Rightarrow z \approx 1.64$
7	$P(-z < Z < z) = 0.8$ $\Rightarrow P(Z < z) - P(Z < -z) = 0.8$ $\Rightarrow P(Z < z) - (1 - P(Z < z)) = 0.8$ $\Rightarrow 2P(Z < z) - 1 = 0.8$ $\Rightarrow P(Z < z) = 0.9$ الاحتمال المعطى (0.9) يمثل المساحة التي تقع يسار القيمة z وهو أكبر من 0.5، إذن: z موجبة. $\Rightarrow z = 1.28$




8	$P(X < 35) = P\left(Z < \frac{35 - 30}{10}\right) = P(Z < 0.5) = 0.6915$
9	$P(X > 38.6) = P\left(Z > \frac{38.6 - 30}{10}\right) = P(Z > 0.86) = 1 - P(Z < 0.86)$ $= 1 - 0.8051 = 0.1949$
10	$P(X > 20) = P\left(Z > \frac{20 - 30}{10}\right) = P(Z > -1) = P(Z < 1) = 0.8413$
11	$P(35 < X < 40) = P\left(\frac{35 - 30}{10} < Z < \frac{40 - 30}{10}\right) = P(0.5 < Z < 1)$ $= P(Z < 1) - P(Z < 0.5)$ $= 0.8413 - 0.6915 = 0.1498$
12	$P(15 < X < 32) = P\left(\frac{15 - 30}{10} < Z < \frac{32 - 30}{10}\right) = P(-1.5 < Z < 0.2)$ $= P(Z < 0.2) - P(Z < -1.5) = P(Z < 0.2) - (1 - P(Z < 1.5))$ $= P(Z < 0.2) + P(Z < 1.5) - 1 = 0.5793 + 0.9332 - 1 = 0.5125$
13	$P(17 < X < 19) = P\left(\frac{17 - 30}{10} < Z < \frac{19 - 30}{10}\right) = P(-1.3 < Z < -1.1)$ $= P(Z < -1.1) - P(Z < -1.3) = 1 - P(Z < 1.1) - (1 - P(Z < 1.3))$ $= P(Z < 1.3) - P(Z < 1.1) = 0.9032 - 0.8643 = 0.0389$
14	$P(X < x) = 0.3 \Rightarrow P(Z < z) = 0.3$ الاحتمال المعطى (0.3) يمثل المساحة التي تقع يسار القيمة z وهو أقل من 0.5، إذن: z سالبة. $\Rightarrow P(Z < -z) = P(Z > z) = 1 - P(Z < z) = 0.3 \Rightarrow P(Z < z) = 0.7$ $\Rightarrow z = 0.52$ إذن، قيمة z التي تحقق الاحتمال المعطى هي $z = -0.52$ $\Rightarrow \frac{x - 30}{10} = -0.52 \Rightarrow x = 24.8$



15	$P(X > x) = 0.6915 \Rightarrow P(Z > z) = 0.6915$ الاحتمال المعطى (0.6915) يمثل المساحة التي تقع يمين القيمة z وهو أكبر من 0.5، إذن: z سالبة. $\Rightarrow P(Z > -z) = 0.6915 \Rightarrow P(Z < z) = 0.6915 \Rightarrow z = 0.5$ إذن، قيمة z التي تحقق الاحتمال المعطى هي $z = -0.5$ $\Rightarrow \frac{x - 30}{10} = -0.5 \Rightarrow x = 25$
16	$P(X < x) = 0.7516 \Rightarrow P(Z < z) = 0.7516$ الاحتمال المعطى (0.7516) يمثل المساحة التي تقع يسار القيمة z وهو أكبر من 0.5، إذن: z موجبة. $\Rightarrow z = 0.67$ $\Rightarrow \frac{x - 30}{10} = 0.67 \Rightarrow x = 36.7$
17	$P(X > x) = 0.09 \Rightarrow P(Z > z) = 0.09$ الاحتمال المعطى (0.09) يمثل المساحة التي تقع يمين القيمة z وهو أقل من 0.5، إذن: z موجبة. $\Rightarrow P(Z > z) = 0.09 \Rightarrow P(Z < z) = 1 - 0.09 = 0.91$ $\Rightarrow z = 1.34$ $\Rightarrow \frac{x - 30}{10} = 1.34 \Rightarrow x = 43.4$
18	$P(X > 1020) \Rightarrow P\left(Z > \frac{1020 - 1000}{10}\right) = P(Z > 2) = 1 - P(Z < 2)$ $= 1 - 0.9772 = 0.0228$ إذن، النسبة المئوية للحاويات التي تريد كتلتها عن 1020 kg هي 2.28%
19	$P(990 < X < 1010) \Rightarrow P\left(\frac{990 - 1000}{10} < Z < \frac{1010 - 1000}{10}\right)$ $= P(-1 < Z < 1) = P(Z < 1) - P(Z < -1)$ $= 2P(Z < 1) - 1$ $= 2(0.8413) - 1 = 0.6826$ إذن، النسبة المئوية للحاويات التي تتراوح كتلتها بين 990 kg و 1010 kg هي 68.26%
20	$P(X < 1020) = P\left(Z < \frac{1020 - 1000}{10}\right) = P(Z < 2) = 0.9772$ إذن، النسبة المئوية للحاويات الصالحة للشحن هي 97.72%



21	
22	$P(X > 155) \Rightarrow P\left(Z > \frac{155 - 162}{6.3}\right) \approx P(Z > -1.11) = P(Z < 1.11)$ $= 0.8665$
23	$P(X > 169) \Rightarrow P\left(Z > \frac{169 - 162}{6.3}\right) \approx P(Z > 1.11) = 1 - 0.8665$ $= 0.1335$



تتنوع الإجابات لوجود عدد لانهائي من الفترات $[z_1, z_2]$ والتي يقع ضمنها النسبة المعطاة من الطالبات. هذه بعض الإجابات المحتملة:

- نختار البحث عن فترة على الشكل $[-1, z]$ بحيث: $P(-1 < Z < z) = 0.5$
 $\Rightarrow P(Z < z) - P(Z < -1) = 0.5$
 $\Rightarrow P(Z < z) - (1 - P(Z < 1)) = 0.5$
 $\Rightarrow P(Z < z) + P(Z < 1) - 1 = 0.5$
 $\Rightarrow P(Z < z) + P(Z < 1) = 1.5$
 $\Rightarrow P(Z < z) + 0.8413 = 1.5$
 $\Rightarrow P(Z < z) = 0.6587$
 $\Rightarrow z = 0.4$

إذن، الفترة المطلوبة لقيم z هي: $[-1, 0.4]$

$$\frac{x_1 - 162}{6.3} = -1 \Rightarrow x_1 = 155.7$$

$$\frac{x_2 - 162}{6.3} = 0.4 \Rightarrow x_2 = 164.52$$

إذن، الفترة $[155.7, 164.52]$ من الأطوال تحوي 50% من الطالبات.

24

- نختار أيضًا الحل السهل $Z > 0$ والذي يشمل 50% من البيانات، أي الفترة $Z \in [0, \infty)$ وفي قيم X (الأطوال)، هذا يعني الفترة $(162, \infty)$

وبما أن المساحات عندما $Z > 3.4$ صغيرة جدًا، كما يظهر في جدول التوزيع الطبيعي المعياري، فيمكن إهمالها ويمكن اعتبار أن 50% من الطالبات تقع أطوالهن ضمن $0 < Z < 3.4$ التي تقابل فترة

الأطوال $[162 \text{ cm}, 183.42 \text{ cm}]$. (لأن $x_2 = 162 + 3.4 \times 6.3 = 183.42$)


- ويمكننا أن نأخذ فترة على الصورة $[-z_1, z_1]$ تقع فيها أطوال 50% من الطالبات كما هو مبين في الرسم الآتي:

نلاحظ من الرسم أن المساحة على يسار z_1 تساوي 0.75

$$P(Z < z_1) = 0.75 \Rightarrow z_1 = 0.67$$

$$\Rightarrow x_1 = 0.67(6.3) + 162 \approx 166.2$$

$$\Rightarrow x_2 = -0.67(6.3) + 162 \approx 157.8$$



إذن، إحدى الفترات التي تقع ضمنها أطوال 50% من الطالبات هي: $(157.8 \text{ cm}, 166.2 \text{ cm})$



نختار أولاً البحث عن فترة من الشكل $[-2, z]$ حيث: $P(-2 < Z < z) = 0.815$

$$\Rightarrow P(Z < z) - P(Z < -2) = 0.815$$

$$\Rightarrow P(Z < z) - (1 - P(Z < 2)) = 0.815$$

$$\Rightarrow P(Z < z) + P(Z < 2) = 1.815$$

$$\Rightarrow P(Z < z) + 0.9772 = 1.815$$

$$\Rightarrow P(Z < z) = 0.8378$$

$$\Rightarrow z = 0.98$$

إذن، الفترة المطلوبة لقيم z هي: $[-2, 0.98]$

$$\frac{x_1 - 162}{6.3} = -2 \Rightarrow x_1 = 149.4$$

$$\frac{x_2 - 162}{6.3} = 0.98 \Rightarrow x_2 \approx 168.2$$

إذن، الفترة $[149.4, 168.2]$ من الأطوال تحوي 81.5% من الطالبات.

نختار أيضاً البحث عن فترة على الشكل $[-z, z]$ بحيث $P(-z < Z < z) = 0.815$

$$\Rightarrow P(Z < z) - P(Z < -z) = 0.815$$

$$\Rightarrow P(Z < z) - (1 - P(Z < z)) = 0.815$$

$$\Rightarrow 2P(Z < z) - 1 = 0.815$$

$$\Rightarrow P(Z < z) = 0.9075$$

$$\Rightarrow z = 1.32$$

إذن، الفترة المطلوبة لقيم z هي: $[-1.32, 1.32]$

$$\frac{x_1 - 162}{6.3} = -1.32 \Rightarrow x_1 = 153.684 \approx 153.7$$

$$\frac{x_2 - 162}{6.3} = 1.32 \Rightarrow x_2 = 170.316 \approx 170.3$$

إذن، الفترة $[153.7, 170.3]$ من الأطوال تحوي تقريباً 81.5% من الطالبات.